

线代作业8

郑子诺，物理41

2024 年 11 月 6 日

1.

(a)

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda - 5 = 0$$

特征值为

$$\lambda = r \cos \theta - 1, r \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) - 1, r \cos(\theta + \frac{4\pi}{3}) - 1$$

$$r = \frac{4}{\sqrt{3}}, \theta = \frac{1}{3} \arccos \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

对应的特征向量为

$$\alpha = c \begin{bmatrix} \frac{2\lambda + 3}{\lambda^2 + \lambda - 1} \\ \frac{3\lambda + 4}{\lambda^2 + \lambda - 1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + 1 = 0$$

特征值为

$$\lambda = 1, \frac{\sqrt{5} + 1}{2}, \frac{-\sqrt{5} + 1}{2}$$

对应的特征向量分别为

$$\alpha_1 = c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = c \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = c \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(c) 令 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$

$$(\lambda - f(1))(\lambda - f(\omega)) \cdots (\lambda - f(\omega^{n-1})) = 0$$

$$\lambda = f(1), f(\omega), \dots, f(\omega^{n-1})$$

$$\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$$

$$\alpha_k = \begin{bmatrix} 1 \\ \omega^k \\ \vdots \\ \omega^{k(n-1)} \end{bmatrix}, 0 \leq k \leq n-1$$

2.

$$\lambda = 2, 4$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{20} = P \begin{bmatrix} 2^{20} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{20} & 0 \\ 0 & 0 & 4^{20} \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2^{20} & 0 & 0 \\ 2^{19} - 2^{39} & 2^{19} + 2^{39} & -2^{19} + 2^{39} \\ 2^{19} - 2^{39} & -2^{19} + 2^{39} & 2^{19} + 2^{39} \end{bmatrix}$$

3.

$$\det(\lambda I - A) = \det((\lambda A^{-1} - I)A) = (-1)^n \lambda^n \det A \det\left(\frac{1}{\lambda} I - A^{-1}\right)$$

$$\therefore a'_k = \frac{a_{n-k}}{(-1)^n \det A}$$

对于每一个 A 的特征值有

$$\lambda' = \frac{1}{\lambda}$$

4.

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{l=1}^m \sum_{k=1}^n a_{lk} b_{kl} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m b_{kl} a_{lk} = \text{Tr}(BA)$$

5.

$$\text{Tr}(AB - BA) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = 0 \neq \text{Tr}(I_n) = n$$

6.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I & A \\ B & I \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \lambda I - AB & 0 \\ B & I \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} I & 0 \\ -B & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I & A \\ B & I \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \lambda I & A \\ 0 & I - BA \end{bmatrix} \\ \therefore \det(\lambda I - AB) &= \det(\lambda I - BA) \end{aligned}$$

特征值相同。

7.

充分性是显然的。

$$\det(\lambda I - A) = \det(P^{-1}(\lambda I - B)P) = \det(\lambda I - B)$$

很容易发现，要使得一个对角矩阵的对角元素交换顺序，只需要在两边同时乘上一对相同的表示交换两行的初等行变换矩阵，显然两者互为逆。那么我们有

$$B = E_1 E_2 \cdots E_n A E_n^{-1} \cdots E_2^{-1} E_1^{-1} = P^{-1} A P$$

8.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

两者特征方程显然相同，但是不相似。因为初等行列变换不改变矩阵的秩，每一个可逆矩阵又可以表示成初等行列变换的复合，这意味着相似的矩阵具有相同的秩，而 A, B 的秩显然不同，前者为2后者1。

9.

显然可以直接因式分解

$$\phi(B) = (B - \lambda_1 I)(B - \lambda_2 I) \cdots (B - \lambda_n I)$$

然后再显然不过了，该是行列式不为0当且仅当 B 没有和 A 相同的特征值，这直接导出可逆性。

10.

显然有

$$A^n X = A^{n-1} X B = \cdots = X B^n$$

设 $\phi(x)$ 为 A 的特征方程，那么有

$$\phi(A)X = X\phi(B) = 0$$

又由于 $\phi(B)$ 可逆，我们有

$$X = 0$$