Fondamenti di Algebra e Geometria

Cognome.......MatricolaMatricola

GRIGLIA I	OI VALU						
ESERCIZIO	1	2	3	4	5	6	TOTALE
Punteggio							

 \bigcirc TEMPO A DISPOSIZIONE: 2,5 ore

- 1. Siano U e W i sottospazi vettoriali di \mathbb{R}^4 così definiti: $W = <^t (1,1,-1,-1), ^t (3,-2,8,5) > .$ $U = <^t (1,-1,3,2), ^t (-1,2,-6,-4), ^t (-1,3,-9,-6) > .$ Determina la dimensione e una base di U+W e $U \cap W$.
- 2. Calcolare il determinante

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_1^2 & a_1b_1 & b_1^2 \\ a_2^2 & a_2b_2 & b_2^2 \\ a_3^2 & a_3b_3 & b_3^2 \end{vmatrix}$$

Generalizzare l'espressione così ottenuta per un determinante della forma

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \dots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \dots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \dots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix}$$

Calcolare D_2 nel caso particolare $a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$.

3. Stabilisci se il seguente sistema lineare Σ è compatibile e, in caso affermativo, determina le soluzioni

$$\begin{cases} 8x + 7y - 2z = 4 \\ x - 7y + 5z = 4 \\ x + 2y - z = 0. \end{cases}$$

Determina una base per il sottospazio vettoriale delle soluzioni del sistema omogeneo associato a Σ .

4. Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$. Discutere la diagonalizzabilità di una matrice della forma

$$\mathcal{A} = \left(\begin{array}{ccc} a & b & c \\ b & a & b \\ c & b & a \end{array}\right)$$

nel caso particolare $b = 0 \land c = -1$.

 ${\it 5.}$ Determinare una possibile forma canonica di Jordan della matrice seguente:

$$\mathcal{A} = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 2 & 1\\ 2 & -3 & -3 & -2\\ -2 & 3 & 3 & 2\\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

Calcolare $J_2(2)^3$, essendo $J_2(2)$ il blocco di Jordan di ordine 2 relativo all'autovalore 2.

6. Determinante di un endomorfismo: definizione, proprietà, calcolo. Determinante di una matrice: definizione, proprietà, calcolo.