individual	Congruent	Incongruent	xd	xdmean	s	se	t-statistic	conf(-)	conf(+)	x1mean	x2mean	(xi - xdmean)^2	Σ(xi-xdmean)^2	var	s	α	t-critical value	df	cohen's d	p-value
1	12.079	19.278	-7.199	-7.965	4.865	0.993	-8.021	-10.0193679	-5.910	14.051	22.016	0.586	544.330	23.667	4.864826910?	0.05	2.069	23	-1.637	<0,0001
2	16.791	18.741	-1.950									36.178								
3	9.564	21.214	-11.650									13.581								
4	8.630	15.687	-7.057									0.824								
5	14.669	22.803	-8.134									0.029								
6	12.238	20.878	-8.640									0.456								
7	14.692	24.572	-9.880									3.668								
8	8.987	17.394	-8.407									0.196								
9	9.401	20.762	-11.361									11.534								
10	14.480	26.282	-11.802									14.724								
11	22.328	24.524	-2.196									33.279								
12	15.298	18.644	-3.346									21.333								
13	15.073	17.510	-2.437									30.556								
14	16.929	20.330	-3.401									20.828								
15	18.200	35.255	-17.055									82.632								
16	12.130	22.158	-10.028									4.257								
17	18.495	25.139	-6.644									1.744								
18	10.639	20.429	-9.790									3.331								
19	11.344	17.425	-6.081									3.549								
20	12.369	34.288	-21.919									194.720								
21	12.944	23.894	-10.950									8.911								
22	14.233	17.960	-3.727									17.959								
23	19.710	22.058	-2.348									31.548								
24	16.004	21.157	-5.153									7.906								

individual / Congruent / Incongruent