

# MATH143C: Homework 2

Oisin Coveney

April 26, 2020

Unfinished problems: 3.1 17, 21

## Exercise Set 3.1

1

**A:**  $f(x) = \cos x$

$$\begin{aligned}
 P_1(x) &= f(0)\frac{x-0.3}{-0.3} + f(0.3)\frac{x}{0.3-0} \\
 P_1(0.45) &= 0.933005 \\
 |Error_{P_1}| &= 0.032558 \\
 P_2(x) &= f(0)\frac{(x-0.3)(x-0.9)}{(0-0.3)(0-0.9)} + f(0.3)\frac{(x-0)(x-0.9)}{(0.3-0)(0.3-0.9)} + f(0.91)\frac{(x-0)(x-0.3)}{(0.9-0)(0.9-0.3)} \\
 P_2(0.45) &= 0.902455 \\
 |Error_{P_2}| &= 0.002008
 \end{aligned}$$

**B:**  $f(x) = \ln(x+1)$

$$\begin{aligned}
 P_1(x) &= f(0)\frac{x-0.3}{-0.3} + f(0.3)\frac{x}{0.3-0} \\
 P_1(0.45) &= 0.393546 \\
 |Error_{P_1}| &= 0.021983 \\
 P_2(x) &= f(0)\frac{(x-0.3)(x-0.9)}{(0-0.3)(0-0.9)} + f(0.3)\frac{(x-0)(x-0.9)}{(0.3-0)(0.3-0.9)} + f(0.9)\frac{(x-0)(x-0.3)}{(0.9-0)(0.9-0.3)} \\
 P_2(0.45) &= 0.375392 \\
 |Error_{P_2}| &= 0.003828
 \end{aligned}$$

### 3B

Error for 1A:

$$\begin{aligned}
 R_1(\xi, x) &= \frac{f^2(\xi)}{2}(x)(x-0.3) \\
 R_1(0.3, 0.45) &= 0.045558 \\
 R_2(\xi, x) &= \frac{f^3(\xi)}{3!}(x)(x-0.3)(x-0.9) \\
 R_2(0.9, 0.45) &= 0.012452
 \end{aligned}$$

Error for 1B:

$$\begin{aligned}
 R_1(\xi, x) &= \frac{f^2(\xi)}{2}(x)(x-0.3) \\
 R_1(0, 0.45) &= 0.03375 \\
 R_2(\xi, x) &= \frac{f^3(\xi)}{3!}(x)(x-0.3)(x-0.9) \\
 R_2(0, 0.45) &= 0.005063
 \end{aligned}$$

## 5

Using  $[x_2, x_4]$  for  $P_1$ , and  $[x_1, x_3, x_4]$  for  $P_2$

## B

$$\begin{aligned} P_1\left(-\frac{1}{3}\right) &= 0.3505 \\ P_2\left(-\frac{1}{3}\right) &= 0.162944 \\ P_3\left(-\frac{1}{3}\right) &= 0.174519 \end{aligned}$$

## D

$$\begin{aligned} P_1(0.9) &= 0.443312 \\ P_2(0.9) &= 0.436628 \\ P_3(0.9) &= 0.441985 \end{aligned}$$

## 7

### Error for 5B

$$\begin{aligned} n = 1 &\rightarrow \frac{f^2(\xi)}{2!}(x)(x + 0.5) \\ &= \frac{6\xi + 8.002}{2}(x)(x + 0.5) \\ &= (3\xi + 4.001)(x)(x + 0.5) \\ \left(\xi = 0, x = -\frac{1}{3}\right) &\rightarrow = 0.222277 \\ n = 2 &\rightarrow \frac{f^3(\xi)}{3!}(x)(x + 0.25)(x + 0.75) \\ &= \frac{6}{3!}(x)(x + 0.25)(x + 0.75) \\ &= (x)(x + 0.25)(x + 0.75) \\ \left(\xi = 0, x = -\frac{1}{3}\right) &\rightarrow = 0.011574 \end{aligned}$$

## Error for 5D

$$\begin{aligned}
 n = 1 &\rightarrow \frac{f^2(\xi)}{2!}(x - 0.7)(x - 1) \\
 &= \frac{(x - 1)(x - 0.7)(-e^{2\xi} \sin(e^\xi - 2) + e^\xi \cos(e^\xi - 2))}{2} \\
 (\xi = 1, x = 0.9) &\rightarrow = 0.028160 \\
 n = 2 &\rightarrow \frac{f^3(\xi)}{3!}(x - 0.6)(x - 0.8)(x - 1) \\
 &= \frac{(x - 1)(x - 0.8)(x - 0.6)(-e^{3\xi} \cos(e^\xi - 2) - 3e^{2\xi} \sin(e^\xi - 2) + e^\xi \cos(e^\xi - 2))}{6} \\
 (\xi = 1, x = 0.9) &\rightarrow = 0.013832
 \end{aligned}$$

## 9

$$y = 4.25$$

## 10

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sqrt{x - x^2} \\
 P_2(x) &= y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_2)(x_0 - x_1)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\
 \text{Given: } x_0 &= 0, x_2 = 1, x = 0.5 : \\
 f(0.5) &= \sqrt{0.25} = \pm 0.5 \\
 P_2(x) &= 0 \frac{(0.5 - x_1)(0.5 - 1)}{(0 - 1)(0 - x_1)} + \left( \sqrt{x_1 - x_1^2} \right) \frac{(0.5 - 0)(0.5 - 1)}{(x_1 - 0)(x_1 - 1)} + 0 \frac{(0.5 - 0)(0.5 - 1)}{(1 - 0)(0 - x_1)} \\
 &= \left( \sqrt{x_1 - x_1^2} \right) \frac{-0.25}{x_1^2 - x_1} = \frac{-0.25}{\sqrt{x_1 - x_1^2}}
 \end{aligned}$$

Solving for  $f(0.5) - P_2(0.5) = -0.25$ :

$$\begin{aligned}
 \pm 0.5 - \frac{-0.25}{\sqrt{x_1 - x_1^2}} &= -0.25 \\
 \frac{-0.25}{\sqrt{x_1 - x_1^2}} &= \{0.75, -0.25\} \\
 -\frac{1}{\sqrt{x_1 - x_1^2}} &= \{3, -1\} \\
 \left\{ \frac{1}{9}, 1 \right\} &= x_1 - x_1^2 \\
 \text{Using } \frac{1}{9} : x_1 &= \{0.127322003750035, 0.872677996249965\} \\
 \text{Using } 1 : x_1 &= \left\{ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2} \right\}
 \end{aligned}$$

The largest real value between  $(0, 1)$  for  $x_1 = 0.872678$

## 13D

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= \frac{1.216316x(x-1)(x-0.5)}{0.25(0.25-1)(0.25-0.5)} + \frac{1.357008x(x-1)(x-0.25)}{0.5(0.5-1)(0.5-0.25)} \\
 &\quad + \frac{1.381773x(x-0.5)(x-0.25)}{1(1-0.5)(1-0.25)} + \frac{1.0(x-1)(x-0.5)(x-0.25)}{(-1)(-0.5)(0.25)} \\
 &= 25.948083x(x-1)(x-0.5) - 21.712130x(x-1)(x-0.25) \\
 &\quad + 3.684729x(x-0.5)(x-0.25) - 8.0(x-1)(x-0.5)(x-0.25) \\
 R_3(x) &= \frac{f^4(\xi)}{4!} (x-1)(x-0.5)(x-0.25)(x) \\
 &= \frac{\sin(\xi) + \cos(\xi)}{24} (x-1)(x-0.5)(x-0.25)(x) \\
 \left(\xi = \frac{\pi}{4}, x = 0.8316\right) &\rightarrow = 0.001591
 \end{aligned}$$

## 17

## 19

### Interpolating polynomial

$$P_5(x) = -\frac{10089x^5}{4000000} + \frac{6001123x^4}{240000} - \frac{2379665339x^3}{24000} + \frac{471801682097x^2}{2400} - \frac{116923918291129x}{600} + 77269170756852$$

### Estimates

1. 1950: 192539
2. 1975: 215525
3. 2014: 306214
4. 2020: 266165

The estimated 1950 from the interpolating polynomial was off by more than 40%, while the 2014 figure was off by approximately 3%. I would be skeptical about the estimates that I found in the interpolating polynomial.

## Exercise Set 3.2

### 1B

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -1.333333x(-2.0(-x-0.75)(1.43875x+0.694625) - 2.0(0.18825x+0.069375)(x+0.25)) \\
 &\quad - 1.333333(-x-0.75)(-2.0x(1.43875x+0.694625) - 2.0(-x-0.5)(3.06425x+1.101)) \\
 f\left(-\frac{1}{3}\right) &= 0.174519
 \end{aligned}$$

**3**

**A**

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 3^x \\
 (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) &= (-2, -1, 0, 1, 2) \\
 P(\sqrt{3}) &= 6.780246 \\
 f(\sqrt{3}) &= 6.704992 \\
 \text{Error (Part C)} &= 6.780246 - 6.704992 = 0.075254
 \end{aligned}$$

**B**

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sqrt{x} \\
 (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) &= (0, 1, 2, 4, 5) \\
 P(\sqrt{3}) &= 1.330337 \\
 f(\sqrt{3}) &= 1.316074 \\
 \text{Error (Part C)} &= 1.330337 - 1.316074 = 0.014263
 \end{aligned}$$

**5**

$$\begin{aligned}
 P_2 &= 4.0 \\
 P_{1,2} &= 3.2 \\
 P_{0,1,2} &= 3.08
 \end{aligned}$$

**12**

$$\begin{aligned}
 x &= [0.3, 0.4, 0.5, 0.6] \\
 y = x - e^{-x} &= [-0.440818, -0.27032, -0.106531, 0.051188] \\
 f^{-1}(0) &= 0.567143
 \end{aligned}$$

**3.3**

**1B**

$$\begin{aligned}
 P_1 &= -0.1769446 + 1.9069687(x - 0.6) \\
 P_1(0.9) &= 0.395146 \\
 P_2 &= -0.1769446 + 1.9069687(x - 0.6) + 0.959224(x - 0.7)(x - 0.6) \\
 P_2(0.9) &= 0.452700 \\
 P_3 &= -0.1769446 + 1.9069687(x - 0.6) + 0.959224(x - 0.7)(x - 0.6) + (-1.785741)(x - 0.8)(x - 0.7)(x - 0.6) \\
 P_3(0.9) &= 0.441985
 \end{aligned}$$

### 3B

Using  $x_1, x_2$  for  $P_1$ , and  $x_1, x_2, x_3$  for  $P_2$

$$P_1 = 2.905876x - 0.574574$$

$$P_1(0.25) = 0.151895$$

$$P_2 = 2.905876x - 2.438209(x - 0.2)(x - 0.1) - 0.574574$$

$$P_2(0.25) = 0.133608$$

$$P_3 = 3.365129x - 0.473152(x - 0.3)(x - 0.2)(x - 0.1) - 2.296264(x - 0.2)(x - 0.1) - 0.957012$$

$$P_3(0.25) = -0.132775$$

### 5B

Using  $x_1, x_2$  for  $P_1$ , and  $x_1, x_2, x_3$  for  $P_2$

$$P_1 = 2.905876x - 0.574574$$

$$P_1(0.25) = 0.151895$$

$$P_2 = 2.905876x - 2.296264(x - 0.3)(x - 0.2) - 0.865162$$

$$P_2(0.25) = -0.132952$$

$$P_3 = 2.418235x - 0.473152(x - 0.4)(x - 0.3)(x - 0.2) - 2.438209(x - 0.4)(x - 0.3) - 0.718869$$

$$P_3(0.25) = -0.132775$$

### 8

#### A

$$P_4(x) = 0.063016x(x - 0.6)(x - 0.3)(x - 0.1) + 0.215x(x - 0.3)(x - 0.1) + 0.5725x(x - 0.1) + 1.0517x - 6.0$$

#### B

$$P_5(x) = 0.014159x(x - 1)(x - 0.6)(x - 0.3)(x - 0.1) + 0.063016x(x - 0.6)(x - 0.3)(x - 0.1) + 0.215x(x - 0.3)(x - 0.1) + 0.5725x(x - 0.1) + 1.0517x - 6.0$$

### 16

$$f[x_0, x_1] = 5.0$$

$$f[x_0] = 1.0$$

$$f[x_1] = 3.0$$

### 18

#### A

$$P_4(0.75) = 72.86 \rightarrow 1 \text{ minute, } 12.86 \text{ seconds}$$

The actual time was 1:13, so this estimate is extremely close.

#### B

$$\frac{d}{dx}P_4(1.25) = 89.72 \frac{\text{seconds}}{\text{mile}} \approx 40.12 \text{ miles per hour}$$

**20**

	x	P(x)	Q(x)	Actual
0	-2.0	-1	-1	-1
1	-1.0	3	3	3
2	0.0	1	1	1
3	1.0	-1	-1	-1
4	2.0	3	3	3

$P(x)$  and  $Q(x)$  are the same function - when you reduce the two equations they are equivalent. Thus,  $P(x)$  does not violate the uniqueness property of interpolating polynomials.

**21**

$$\begin{aligned}f[x_2] &= a_2(-x_0 + x_2)(-x_1 + x_2) + f[x_0] + f[x_1](-x_0 + x_2) \\-f[x_0] - f[x_1](-x_0 + x_2) + f[x_2] &= a_2(-x_0 + x_2)(-x_1 + x_2) \\ \frac{-f[x_0] - f[x_1](-x_0 + x_2) + f[x_2]}{(-x_0 + x_2)(-x_1 + x_2)} &= a_2 \\ -\frac{f[x_1]}{-x_1 + x_2} + \frac{-f[x_0] + f[x_2]}{(-x_0 + x_2)(-x_1 + x_2)} &= a_2 \\ f[x_0, x_1, x_2] &= a_2\end{aligned}$$

**22**

$$\begin{aligned}f(x) &= P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n) \\ \text{Substituting } f(x) : \\ P_n(x) + \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n) &= P_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n) \\ \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} &= f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]\end{aligned}$$

**Exercise Set 8.3****1A / 3A**

$$\begin{aligned}(x_0, x_1, x_2) &= \left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, 0, \frac{3}{\sqrt{2}}\right) \\ P_3(x) &= 0.532042x(x + 0.866025) + 0.66901x + 1.0 \\ f(x) - P(x) &= \frac{e^\xi}{3!} * \frac{1}{2^2} = 0.1132617\end{aligned}$$



## Exercise Set 3.4

### 1C

$$P_5(x) = -0.024751 + 0.751(x + 0.5) + 2.751(x + 0.5)^2 + (x + 0.25)(x + 0.5)^2 \\ - 7.105427 * 10^{-15}(x + 0.25)^2(x + 0.5)^2 + 2.131628 * 10^{-14}x(x + 0.25)^2(x + 0.5)^2$$

### 5

#### A / B

$$H_2(x) = 0.29552 + 0.95534(x - 0.3) + -0.142(x - 0.3)^2 + -1.05(x - 0.32)(x - 0.3)^2 \\ + 20.77778(x - 0.32)^2(x - 0.3)^2 + -436.29630(x - 0.35)(x - 0.32)^2(x - 0.3)^2 \\ H_2(0.34) = 0.33349 \\ \sin 0.34 = 0.33349 \\ R_2(0.34) = 0.000003$$

With 5 digit rounding, the error bound exceeds the actual error of 0.

### C

$$H_7(x) = 0.29552 + 0.95534(x - 0.3) + -0.142(x - 0.3)^2 + -1.05(x - 0.32)(x - 0.3)^2 \\ - 32.77778(x - 0.32)^2(x - 0.3)^2 + 17574.07407(x - 0.33)(x - 0.32)^2(x - 0.3)^2 \\ - 744814.81482(x - 0.33)^2(x - 0.32)^2(x - 0.3)^2 + 29455555.55570(x - 0.35)(x - 0.33)^2(x - 0.32)^2(x - 0.3)^2 \\ H_7(0.34) = 0.33349 \\ \sin 0.34 = 0.33349 \\ R_7(0.34) = 3.75264 * 10^{-19}$$

### 9

$$H_9(x) = 75x + -0.031111x^2(x - 3)^2 + -0.006444x^2(x - 5)(x - 3)^2 + 0.002264x^2(x - 5)^2(x - 3)^2 \\ - 0.000913x^2(x - 8)(x - 5)^2(x - 3)^2 + 0.000131x^2(x - 8)^2(x - 5)^2(x - 3)^2 \\ - 2.022363 * 10^{-5}x^2(x - 13)(x - 8)^2(x - 5)^2(x - 3)^2 \\ H_9(10) = 742.50 \\ H'_9(10) = 48.38$$

The car surpasses 55 miles per hour at approximately 5.65147 seconds.

## 10

The given divided difference table provides the coefficients to write the Hermite polynomial using the Newton's Divided Difference form of the interpolating polynomial.

$$\begin{aligned}a_0 &= f[z_0] = f(x_0) \\a_1 &= f[z_0, z_1] = f'(x_0) \\a_2 &= f[z_0, z_1, z_2] = \frac{f[z_1, z_2](x - z_0) - f[z_0, z_1](x - z_2)}{z_2 - z_1} \\a_3 &= f[z_0, z_1, z_2, z_3] = \frac{f[z_1, z_2, z_3](x - z_0) - f[z_0, z_1, z_2](x - z_3)}{z_3 - z_0}\end{aligned}$$

Using these coefficients:

$$H_3(x) = f[z_0] + f[z_0, z_1](x - x_0) + f[z_0, z_1, z_2](x - x_0)^2 + f[z_0, z_1, z_2, z_3](x - x_0)^2(x - x_1)$$

## Exercise Set 3.5

### 3C

i	a	b	c	d
0	-0.02475000	1.03237500	-0.00000000	6.50200000
1	0.33493750	2.25150000	4.87650000	-6.50200000

## 11

$$\begin{aligned}3x^2 - 2 &= -b - 2c(x - 1) - 3d(x - 1)^2 \\6x &= -2c - 6d(x - 1) \\d &= -1 \\c &= -3 \\b &= -1\end{aligned}$$

## 15

$$\begin{aligned}S_0 &= 2.103418x + 1.0 \\S_1 &= 2.324637x + 0.988939 \\\int_0^{0.05} S_0 + \int_{0.05}^{0.1} S_1 &= 0.110794 \\\int_0^{0.1} e^x &= 0.110701 \\|Error| &= 9.223578 * 10^{-5}\end{aligned}$$

17

Range	a	b	c	d
(0,0.25)	1.00	-0.76	-0.00	-6.63
(0.25,0.5)	0.71	-2.00	-4.97	6.63
(0.5,0.75)	0.00	-3.24	-0.00	6.63
(0.75,1)	-0.71	-2.00	4.97	-6.63

$$\int_0^1 S(x) = -0.493792$$
$$\int_0^1 f(x) = 0$$
$$|Error| = 0.493792$$

$$S'(0.5) = f'(0.5) = 0$$
$$|Error| = 0$$

$$S''(0.5) = 0$$
$$f''(0.5) = -\frac{\pi}{2}$$
$$|Error| = -\frac{\pi}{2}$$

Exercise Set 3.6

3A

	0	1	2	3
a	1.00	1.50	15.00	-11.50
b	6.00	-14.25	19.50	-9.25

Exercise Set 4.1

1

A

$$\begin{bmatrix} 0.85 & 0.80 \end{bmatrix}$$

B

$$\begin{bmatrix} 3.71 & 3.15 \end{bmatrix}$$

**3****A**

$x$	$ Error $	$Bound$
0.000000	0.294000	0.300000
0.200000	0.284597	0.277860
0.400000	0.259175	0.250818

**B**

$x$	$ Error $	$Bound$
0.000000	0.294000	0.300000
0.200000	0.284597	0.277860
0.400000	0.259175	0.250818

**13**

Using the five point midpoint formula:

$$f'(x) = \frac{1}{12} (f(x-2h) - 8(f(x-h)) + 8(f(x+h)) - f(x+h))$$

$$f'(3) = 0.22585$$

$$|Error| = \frac{f^5(\xi) * (1)^4}{30} = 0.766667$$

**15****A**

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = 0.852$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0.796$$

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = 0.852$$

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = 0.796$$

**B**

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = 3.707$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 3.153$$

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = 3.707$$

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = 3.153$$

**18A**

$$f(x) = -0.339961x^4 + 0.428736x^3 - 0.770008x^2 + 0.072283x + 0.993323$$

$$f'(x) = -1.359844x^3 + 1.286209x^2 - 1.540016x + 0.072283$$

$$f'(0.4) = -0.424960$$

$$f''(x) = -4.079531x^2 + 2.572419x - 1.540016$$

$$f''(0.4) = -1.163773$$

**24**

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= A \left( f(x_0) + (-h)f'(x_0) + \frac{f''(x_0)(-h)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(-h)^3}{3!} + \frac{f^4(x_0)(-h)^4}{4!} + \frac{f^5(\xi)(-h)^5}{5!} \right) \\ &\quad + B(f(x_0)) \\ &\quad + C \left( f(x_0) + (h)f'(x_0) + \frac{f''(x_0)(h)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(h)^3}{3!} + \frac{f^4(x_0)(h)^4}{4!} + \frac{f^5(\xi)(h)^5}{5!} \right) \\ &\quad + D \left( f(x_0) + (2h)f'(x_0) + \frac{f''(x_0)(2h)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(2h)^3}{3!} + \frac{f^4(x_0)(2h)^4}{4!} + \frac{f^5(\xi)(2h)^5}{5!} \right) \\ &\quad + E \left( f(x_0) + (3h)f'(x_0) + \frac{f''(x_0)(3h)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(3h)^3}{3!} + \frac{f^4(x_0)(3h)^4}{4!} + \frac{f^5(\xi)(3h)^5}{5!} \right) \\ &= (A + B + C + D + E)f(x_0) \\ &\quad + (-hA + hC + 2hD + 3hE)(f'(x_0)) \\ &\quad + (0.5(h^2)A + 0.5(h^2)C + 2h^2D + 4.5h^2E) \\ &\quad + \frac{1}{6}(-h^3A + h^3C + 8h^3D + 27h^3) \\ &\quad + \frac{1}{24}(h^4A + h^4C + 16h^4D + 81h^4E) \end{aligned}$$

Using  $h = 1$  :

$$(A, B, C, D, E) = (-0.25, -0.83333333, 1.5, -0.5, 0.08333333)$$

The polynomial:

$$f'(x_0) = -\frac{0.25}{h}(h + x_0) - \frac{0.83333333}{h}(x_0) + \frac{1.5}{h}(-h + x_0) - \frac{0.5}{h}(-2h + x_0) + \frac{0.08333333}{h}(-3h + x_0) + O(h^4)$$

**25**

$$\begin{aligned}f'(0.4) &= -1.25f(0.2) - 4.16666665f(0.4) + 7.5f(0.6) - 2.5f(0.8) + 0.41666665f(1.0) \\&= -0.424984 \\f'(0.8) &= -1.25f(0.6) - 4.16666665f(0.8) + 7.5f(1.0) - 2.5f(1.2) + 0.41666665f(1.4) \\&= -1.032772\end{aligned}$$

**29**

$$\begin{aligned}e(h) &= \frac{\epsilon}{h} + \frac{h^2}{6}M \\e'(h) &= \frac{Mh}{3} - \frac{\epsilon}{h^2} \\ \text{Using } e'(h) &= 0 \\ h &= \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M}}\end{aligned}$$

If  $e'(h) < 0, h < \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M}}$ , and if  $e'(h) > 0, h > \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M}}$ . Thus, there is a minimum at  $h = \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M}}$ .

**27**

Using  $x = 420$  and  $f(x) = x^4$ :

n	$f'_n(x)$	$f(x)$	Absolute Error
0	297412081.0000000000000000	296352000	1060081.0000000000000000
1	296457856.800999999046326	296352000	105856.800999999046326
2	296362584.168000996112823	296352000	10584.168000996112823
3	296353058.401679992675781	296352000	1058.401679992675781
4	296352105.840016782283783	296352000	105.840016782283783
5	296352010.584000170230865	296352000	10.584000170230865
6	296352001.058399975299835	296352000	1.058399975299835
7	296352000.105839967727661	296352000	0.105839967727661
8	296352000.010583996772766	296352000	0.010583996772766
9	296352000.001058399677277	296352000	0.001058399677277
10	296352000.000105857849121	296352000	0.000105857849121
11	296352000.000010609626770	296352000	0.000010609626770
12	296352000.000001072883606	296352000	0.000001072883606
13	296352000.000000119209290	296352000	0.000000119209290
14	296352000	296352000	0
15	296352000	296352000	0
16	296352000	296352000	0
17	296352000	296352000	0
18	296352000	296352000	0
19	296352000	296352000	0
20	296352000	296352000	0

As  $n$  increases,  $f'_n(x)$  comes closer to the actual value of  $f'(x)$ .

**4.2****1****A**

Output from program:

$h$	$N_1$	$N_2$	$N_3$
$h$	0.841181	0.000000	0.000000
$\frac{h}{2}$	0.911608	0.982035	0.000000
$\frac{h}{4}$	0.953102	0.994596	1.007157

$$N_3(h) = 1.007157$$

**C**

$h$	$N_1$	$N_2$	$N_3$
$h$	2.290365	0.000000	0.000000
$\frac{h}{2}$	2.305264	2.305501	0.000000
$\frac{h}{4}$	2.295243	2.295084	2.295074

$$N_3(h) = 2.250282$$

**5**

$h$	$N_1$	$N_2$	$N_3$	$N_4$
$h$	1.570796	0.000000	0.000000	0.000000
$\frac{h}{2}$	1.896119	1.901283	0.000000	0.000000
$\frac{h}{4}$	1.974232	1.975472	1.975544	0.000000
$\frac{h}{8}$	1.993570	1.993877	1.993895	1.993896

$$N_4(h) = 1.993896$$

**8**

To remove fluff from the calculations, let's define some variables:

$$A = \frac{1}{2}f''(x_0)$$

$$B = \frac{1}{6}f^3(x_0)$$

$$D(a) = f(x_0 + a) - f(x_0)$$

$$N_1(h) = -Ah - Bh^2 + \mathcal{O}(h^3) + \frac{D(h)}{h}$$

$$N_1(2h) = -2Ah - 4Bh^2 + \mathcal{O}(h^3) + \frac{D(2h)}{2h}$$

$$N_2(h) = 2 * N_1(h) - N_1(2h) = 2Bh^2 + \mathcal{O}(h^3) + \frac{2D(h)}{h} - \frac{D(2h)}{2h}$$

$$N_2(2h) = 8Bh^2 + \mathcal{O}(h^3) + \frac{D(2h)}{h} - \frac{D(4h)}{4h}$$

$$N_3(h) = 4 * N_2(h) - N_2(2h) = \mathcal{O}(h^3) + \frac{32D(h) - 12D(2h) + D(4h)}{12h}$$

Substituting  $D(a)$  back into the equation:

$$N_3(h) = \mathcal{O}(h^3) + \frac{-21f(x) + 32f(h+x) - 12f(2h+x) + f(4h+x)}{12h} + \mathcal{O}(h^3)$$



9

$$\begin{aligned}
 N_1(h) &= K_1h + K_2h^2 + D(h) \\
 N_1(h/3) &= \frac{K_1h}{3} + \frac{K_2h^2}{9} + D\left(\frac{h}{3}\right) \\
 N_1(h/9) &= \frac{K_1h}{9} + \frac{K_2h^2}{81} + D\left(\frac{h}{9}\right) \\
 N_2(h) &= -\frac{K_2h^2}{3} + \frac{3D\left(\frac{h}{3}\right)}{2} - \frac{D(h)}{2} \\
 N_2(h/3) &= -\frac{K_2h^2}{27} + \frac{3D\left(\frac{h}{9}\right)}{2} - \frac{D\left(\frac{h}{3}\right)}{2} \\
 N_3(h) &= \frac{27D\left(\frac{h}{9}\right)}{16} - \frac{3D\left(\frac{h}{3}\right)}{4} + \frac{D(h)}{16}
 \end{aligned}$$

11

A / B / C

$$\begin{aligned}
 N_1(h) &= K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + (h+1)^{\frac{1}{h}} \\
 N_1(0.04) &= 0.04K_1 + 0.0016K_2 + 6.4 \cdot 10^{-5}K_3 + 2.665836 \\
 N_2(h) &= -\frac{K_2h^2}{2} - \frac{3K_3h^3}{4} + 2\left(\frac{h}{2} + 1\right)^{\frac{2}{h}} - (h+1)^{\frac{1}{h}} \\
 N_2(0.04) &= -0.0008K_2 - 4.8 \cdot 10^{-5}K_3 + 2.71734 \\
 N_3(h) &= \frac{K_3h^3}{8} + \frac{8\left(\frac{h}{4} + 1\right)^{\frac{4}{h}}}{3} - 2\left(\frac{h}{2} + 1\right)^{\frac{2}{h}} + \frac{(h+1)^{\frac{1}{h}}}{3} \\
 N_3(0.04) &= 8.0 \cdot 10^{-6}K_3 + 2.718273 \\
 e &= 2.718282
 \end{aligned}$$

The assumption in B seems to hold up. The absolute error between  $N_3$  and the exact answer is approximately 0.000009.

## Exercise Set 4.3

1 / 3

Using the trapezoidal rule:

$$\frac{h}{2} (f(a) + f(a+h))$$

A

$$\begin{aligned}
 X &= [0.5, 1], Y = [0.0625, 1] \rightarrow 0.265625 \\
 \text{Error Bound} &= 0.125000000000000 \\
 \text{Actual Error} &= 0.071875
 \end{aligned}$$

**C**

$$X = [1, 1.5], Y = [0.0, 0.912296] \rightarrow 0.228074$$

$$\text{Error Bound} = 0.0396971897522534$$

$$\text{Actual Error} = 0.03581476557804644$$

**H**

$$X = [0, 0.785398], Y = [0.0, 10.550724] \rightarrow 4.143260$$

$$\text{Error Bound} = 2.12980904832081$$

$$\text{Actual Error} = 1.5546310226869071$$

**19**

$i$	$x^i$	$\int_{-1}^1 f(x)$	$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
0	1	2	2
1	$x$	0	0
2	$x^2$	$2/3$	$2/3$
3	$x^3$	0	0
4	$x^4$	$2/5$	$2/9$

At  $x^4$ , the values diverge. Thus, the degree of precision is 3.

**21**

$i$	$x^i = f(x)$	$c_0 f(-1) + c_1 f(1) + c_2(1)$	$\int_{-1}^1 f(x)$
0	1	$c_0 + c_1 + c_2$	2
1	$x$	$-c_0 + c_2$	0
2	$x^2$	$c_0 + c_2$	$2/3$

Solving for the unknowns:

$$c_0 + c_1 + c_2 - 2 = 0$$

$$-c_0 + c_2 = 0$$

$$c_0 + c_2 - \frac{2}{3} = 0$$

$$(c_0, c_1, c_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

## 26

Substituting  $(x_0, x_1, x_2)$  for  $(x_0, x_0 + h, x_0 + 2h)$

$i$	$f(x) = x^{i+1}$	$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx$	$a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)$
0	$x$	$-\frac{x_0^2}{2} + \frac{(2h+x_0)^2}{2}$	$a_0 x_0 + a_1 (h + x_0) + a_2 (2h + x_0)$
1	$x^2$	$-\frac{x_0^3}{3} + \frac{(2h+x_0)^3}{3}$	$a_0 x_0^2 + a_1 (h + x_0)^2 + a_2 (2h + x_0)^2$
2	$x^3$	$-\frac{x_0^4}{4} + \frac{(2h+x_0)^4}{4}$	$a_0 x_0^3 + a_1 (h + x_0)^3 + a_2 (2h + x_0)^3$

$$(a_0, a_1, a_2) = \left( \frac{h}{3}, \frac{4h}{3}, \frac{h}{3} \right)$$

Using the new equation:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} x^4 dx &= f^4(\xi)k + \frac{hx_0^4}{3} + \frac{4hx_1^4}{3} + \frac{hx_2^4}{3} \\ -\frac{x_0^5}{5} + \frac{x_2^5}{5} &= 24k + \frac{hx_0^4}{3} + \frac{4hx_1^4}{3} + \frac{hx_2^4}{3} \end{aligned}$$

Substituting  $(x_0, x_1, x_2)$  for  $(x_0, x_0 + h, x_0 + 2h)$

$$\Rightarrow -\frac{x_0^5}{5} + \frac{(2h+x_0)^5}{5} = \frac{hx_0^4}{3} + \frac{4h(h+x_0)^4}{3} + \frac{h(2h+x_0)^4}{3} + 24k$$

Solving for  $k$  reveals:

$$k = -\frac{h^5}{90}$$

## 4.4

### 1 / 3

	$f(x)$	$Q1$	$Q3$
$A$	$x \log(x)$	0.639900	0.636310
$C$	$\frac{2}{x^2+4}$	0.784241	0.785398
$E$	$e^{2x} \sin(3x)$	-13.575979	-14.183342

## 7B

$$\int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) \approx 3.109337$$

## 9

Plugging in the given (X, Y) data gives use the equation:

$$4\alpha + \frac{3h}{2} + 0.5 = 0$$

Substituting  $h = 0.25$  and solving for  $\alpha$  gives:

$$\alpha = 0.21875$$

## 11A

$$\begin{aligned}
 f(\xi) &= e^{2\xi} \sin(3\xi) \\
 f''(\xi) &= (-5 \sin(3\xi) + 12 \cos(3\xi)) e^{2\xi} \\
 \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi) &= \frac{h^2 (-5 \sin(3\xi) + 12 \cos(3\xi)) e^{2\xi}}{6} \\
 \frac{h^2 (-5 \sin(6) + 12 \cos(6)) e^4}{6} &< 0.0001 \\
 h &< 0.000922296 \\
 n \geq \frac{b-a}{h} = \frac{2}{h} &= \frac{2}{0.000922296} = 2168.5 \\
 h &< 0.000922296, n \geq 2169
 \end{aligned}$$

## 13

### A

$$\begin{aligned}
 f(\xi) &= \frac{1}{\xi+4} \\
 f''(\xi) &= \frac{2}{(\xi+4)^3} \\
 \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi) &= \frac{h^2}{3(\xi+4)^3} \\
 \frac{h^2}{192} &< 1.0 \cdot 10^{-5} \\
 h &< 0.0438178 \\
 n \geq \frac{b-a}{h} = \frac{2}{h} &= \frac{2}{0.0438178} = 45.6435 \\
 h &< 0.0438178, n \geq 46 \\
 \int_0^2 \frac{1}{x+4} dx &\approx 0.4054708
 \end{aligned}$$

### B

$$\begin{aligned}
 \frac{-(b-a)h^4 f^4(\xi)}{180} &= \frac{4 \left| \frac{h^4}{(\xi+4)^5} \right|}{15} \\
 \frac{|h^4|}{3840} &< 1.0 \cdot 10^{-5} h &< 0.4426727 \\
 n \geq \frac{2}{h} &= 4.51801 \\
 \int_0^2 \frac{1}{x+4} dx &\approx 0.4054714
 \end{aligned}$$

## 21

Using the trapezoidal composite rule:

$$n = 9600, h = 0.005, \int_0^{48} \sqrt{1 + \cos x^2} dx \approx 58.470469$$