
Stage 1: default settings of the pipeline on appendicularian, other tunicate and vertebrate genomes
O. dioica OKI2018
O. dioica OSKA2016
O. dioica OdB3
O. longicauda
O. albicans
O. vanhoeffeni
B. stygius
M. erythrocephalus
F. borealis
C. intestinalis
C. robusta
C. savignyi
H. roretzi
S. clava
T. democratica
H. sapiens
M. musculus
D. rerio
0/12
0/14
0/21
0/28
0/20
0/16
0/6
0/7
0/19
2/21
2/19
1/16
1/17
0/25
1/21
12/30
12/30
10/47
0
10
20
30
40
selenocysteine predictions
(red: with a SECIS at the Rfam threshold)
5/12
0/14
0/21
no annotation
no annotation
no annotation
no annotation
no annotation
no annotation
17/22
19/20
no annotation
no annotation
8/26
10/22
27/34
24/36
47/50
0.0
0.5
1.0
fraction in correctly
annotated genes
1
1
1
4
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
7
1
1
3
tRNA-Sec loci
SEPHS2
PSTK
SEPSECS
EEFSEC
SECISBP2
TRNAU1AP
machinery (red: SEPHS2 with selenocysteine;
open: partial prediction; ×: not found)
Appendicularians
Other tunicates
Vertebrates