PSTK: intron positions on the protein alignment

length; identity to human / OdB3

Vertebrates

Homo sapiens — 358 aa; 100% / 17%

Mus musculus — 359 aa; 76% / 18%

Danio rerio (1) — 352 aa; 37% / 19%

Danio rerio (2) — 365 aa; 36% / 19%

Cephalochordate

Branchiostoma lanceolatum — 382 aa; 33% / 19%

Other tunicates

Ciona intestinalis — 320 aa; 25% / 20%

Ciona robusta — 321 aa; 25% / 18%

Phallusia mammillata — 319 aa; 26% / 20%

Styela clava — 323 aa; 26% / 20%

Botryllus schlosseri — 322 aa; 25% / 18%

Thalia democratica — RefSeq XM_082946145.1: 312 codons, one exon (protein not available here, not aligned)

O. dioica

OKI2018 (Okinawa) — 241 aa; 22% / 65%

KUM-M3-7f (Okinawa) — 241 aa; 22% / 64%

OSKA2016 (North Pacific) — 246 aa; 20% / 87%

AOM-5-5f (North Pacific) — 246 aa; 19% / 89%

OdB3 (North Atlantic) — 246 aa; 17% / 100%

Bar2_p4 (North Atlantic) — 246 aa; 17% / 99%

Other Oikopleura

O. albicans — 243 aa; 21% / 37%

O. vanhoeffeni — 248 aa; 24% / 37%

O. longicauda, SCLD01051426.1 — tblastn HSPs of the O. vanhoeffeni protein (best E 2e-25)

O. longicauda, SCLD01107789.1 — tblastn HSPs of the O. vanhoeffeni protein (best E 2e-19)

Giant larvaceans

M. erythrocephalus, SCLF01145532.1 — tblastn HSPs of the O. vanhoeffeni protein (best E 3e-18)

B. stygius, SCLE01192721.1 — tblastn HSPs of the O. vanhoeffeni protein (best E 1e-09)

Alignment columns, labelled with the residues of human PSTK (NP_001350460.1)

phase 0 · phase 1 · phase 2 · GT-AG · GC-AG, GA-AG, GG-AG · outside the intron classes · RefSeq (sites not read) · human introns · OdB3 introns · aligned residues · tblastn HSP (identity to O. vanhoeffeni)