

Mendoza, 31 de mayo de 2011. –

**Ref: HERNANDEZ MARCOS**  
**Diag: HEMOFILIA A SEVERA CON INHIBIDOR**

Paciente: **HERNANDEZ MARCOS ANTONIO**

F. Nac.: 18/06/97

Edad: 12 años.

Domicilio: Barrio Sargento Cabral. M3 – C 28 – Las Heras. Mendoza.

DNI: 41.112.054

OSPIL N ° 20-21.854.967- 6 - 02

**RESUMEN DE HISTORIA CLINICA**

Paciente de 13 años con diagnóstico de hemofilia A severa e inhibidor. Tiene antecedentes de tíos y primos afectados.

Sus antecedentes de sangrado son los siguientes: en 1998 sangrado de frenillo, en marzo 2000 TEC con herida cortante sin fractura,.

En 2002 herida cortante en frente por TEC.

Hemartrosis en rodillas, tobillos y codos recurrente. Epistaxis y gingivorragia frecuente.

Tiene inhibidor de neutralización de factor VIII con las siguientes determinaciones: 12/01/05: 10 UB, 3/11/05: 7 UB, 17/06/06: 13.9 UB y 29/05/08: 1.1 UB, 9/2/09: 9.6 UB, 16/03/09: 198 UB, 7/6/09: 13.9 UB y 25/09/09: 11 UB, 4/3/10: 4.5 UB.

**El paciente inició tratamiento de PROFILAXIS CON ALTAS DOSIS DE FACTOR VIII en abril de 2011.**

**El paciente ha cumplido correctamente con el tratamiento. Presenta hemartrosis de rodilla derecha por lo que se indica FEIBA 5000 UI POR DÍA X 4 DÍAS.**

**Dr. GUILLERMO ARBESÚ**  
**MEDICO HEMATOLOGO**  
M.P. 6072

Dr. Guillermo Arbesú  
Jefe de Servicio Hematología  
Hospital Humberto Notti

Mendoza, 11 de agosto de 2011. –

**Ref: HERNANDEZ MARCOS**  
**Diag: HEMOFILIA A SEVERA CON INHIBIDOR**

Paciente: **HERNANDEZ MARCOS ANTONIO**

F. Nac.: 18/06/97

Edad: 12 años.

Domicilio: Barrio Sargento Cabral. M3 – C 28 – Las Heras. Mendoza.

DNI: 41.112.054

OSPIL N ° 20-21.854.967- 6 - 02

**RESUMEN DE HISTORIA CLINICA**

Paciente de 14 años con diagnóstico de hemofilia A severa e inhibidor. Tiene antecedentes de tíos y primos afectados.

Sus antecedentes de sangrado son los siguientes: en 1998 sangrado de frenillo, en marzo 2000 TEC con herida cortante sin fractura,.

En 2002 herida cortante en frente por TEC.

Hemartrosis en rodillas, tobillos y codos recurrente. Epistaxis y gingivorragia frecuente.

Tiene inhibidor de neutralización de factor VIII con las siguientes determinaciones: 12/01/05: 10 UB, 3/11/05: 7 UB, 17/06/06: 13.9 UB y 29/05/08: 1.1 UB, 9/2/09: 9.6 UB, 16/03/09: 198 UB, 7/6/09: 13.9 UB y 25/09/09: 11 UB, 4/3/10: 4.5 UB.

El paciente inició tratamiento de **PROFILAXIS CON ALTAS DOSIS DE FACTOR VIII en abril de 2011.**

*El paciente está cumpliendo correctamente con el tratamiento. El día 6/8/11 presenta hemartrosis de rodilla derecha por lo que se indica FEIBA 5000 UI POR DÍA X 5 DÍAS.*

**Se solicita FEIBA 1000 UI x 5 frascos x 5 días Total = 25 frascos de 1000 UI**

**Ultimo título de inhibidor: 24/6/11: 7.5 UB**

**No ha tenido otros episodios hemorrágicos.**

**Dr. GUILLERMO ARBESÚ**  
**MEDICO HEMATOLOGO**  
**M.P. 8072**

Dr. Guillermo Arbesú  
Jefe de Servicio Hematología  
Hospital Humberto Notti

Mendoza, 25 de septiembre de 2011. –

**Ref: HERNANDEZ MARCOS**  
**Diag: HEMOFILIA A SEVERA CON INHIBIDOR**

Paciente: **HERNANDEZ MARCOS ANTONIO**

F. Nac.: 18/06/97

Edad: 12 años.

Domicilio: Barrio Sargento Cabral. M3 – C 28 – Las Heras. Mendoza.

DNI: 41.112.054

OSPIL N ° 20-21.854.967- 6 - 02

### **RESUMEN DE HISTORIA CLINICA**

Paciente de 14 años con diagnóstico de hemofilia A severa e inhibidor. Tiene antecedentes de tíos y primos afectados.

Sus antecedentes de sangrado son los siguientes: en 1998 sangrado de frenillo, en marzo 2000 TEC con herida cortante sin fractura,.

En 2002 herida cortante en frente por TEC.

Hemartrosis en rodillas, tobillos y codos recurrente. Epistaxis y gingivorragia frecuente.

Tiene inhibidor de neutralización de factor VIII con las siguientes determinaciones: 12/01/05: 10 UB, 3/11/05: 7 UB, 17/06/06: 13.9 UB y 29/05/08: 1.1 UB, 9/2/09: 9.6 UB, 16/03/09: 198 UB, 7/6/09: 13.9 UB y 25/09/09: 11 UB, 4/3/10: 4.5 UB.

**El paciente inició tratamiento de PROFILAXIS CON ALTAS DOSIS DE FACTOR VIII en abril de 2011.**

**El día 6/8/11 presenta hemartrosis de rodilla derecha por lo que se indica FEIBA 5000 UI POR DÍA.**

**Inhibidor: 24/6/11: 7.5 UB**

**Marcos está cumpliendo correctamente con el tratamiento, concurriendo diariamente al hospital.**

**Debe continuar con el tratamiento para lograr el objetivo de erradicar el inhibidor.**

Dr. GUILLERMO ARBESÚ  
MEDICO HEMATOLOGO  
M.P. 6072

Dr. Guillermo Arbesú  
Jefe de Servicio Hematología  
Hospital Humberto Notti



Mendoza, 2 de enero de 2013. –

**Ref: HERNANDEZ MARCOS**  
**Diag: HEMOFILIA A SEVERA CON INHIBIDOR**

Paciente: **HERNANDEZ MARCOS ANTONIO**

F. Nac.: 18/06/97

Edad: 15 años.

Domicilio: Barrio Sargento Cabral. M3 – C 28 – Las Heras. Mendoza.

DNI: 41.112.054

OSPIL N ° 20-21.854.967- 6 - 02

### RESUMEN DE HISTORIA CLINICA

Paciente de 15 años con **diagnóstico de hemofilia A severa e inhibidor**. Tiene antecedentes de tíos y primos afectados.

Sus antecedentes de sangrado son los siguientes: en 1998 sangrado de frenillo, en marzo 2000 TEC con herida cortante sin fractura,.

En 2002 herida cortante en frente por TEC.

Hemartrosis en rodillas, tobillos y codos recurrente. Epistaxis y gingivorragia frecuente.

Tiene inhibidor de neutralización de factor VIII con las siguientes determinaciones: 12/01/05: 10 UB, 3/11/05: 7 UB, 17/06/06: 13.9 UB y 29/05/08: 1.1 UB, 9/2/09: 9.6 UB, **16/03/09: 198 UB**, 7/6/09: 13.9 UB y 25/09/09: 11 UB, 4/3/10: 4.5 UB.

Dr. GUILLERMO ARBESÚ  
MEDICO HEMATOLOGO  
M.P. 6072

Dr. Guillermo Arbesú  
Jefe de Servicio Hematología  
Hospital Humberto Notti

Mendoza, 2 de enero de 2013. –

**Ref: HERNANDEZ MARCOS**  
**Diag: HEMOFILIA A SEVERA CON INHIBIDOR**

**Paciente: HERNANDEZ MARCOS ANTONIO**

F. Nac.: 18/06/97

Edad: 15 años.

Domicilio: Barrio Sargento Cabral. M3 – C 28 – Las Heras. Mendoza.

DNI: 41.112.054

OSPIL N ° 20-21.854.967- 6 - 02

### **RESUMEN DE HISTORIA CLINICA**

Paciente de 15 años con diagnóstico de hemofilia A severa e inhibidor. Tiene antecedentes de tíos y primos afectados.

Sus antecedentes de sangrado son los siguientes: en 1998 sangrado de frenillo, en marzo 2000 TEC con herida cortante sin fractura,.

En 2002 herida cortante en frente por TEC.

Hemartrosis en rodillas, tobillos y codos recurrente. Epistaxis y gingivorragia frecuente.

Tiene inhibidor de neutralización de factor VIII con las siguientes determinaciones: 12/01/05: 10 UB, 3/11/05: 7 UB, 17/06/06: 13.9 UB y 29/05/08: 1.1 UB, 9/2/09: 9.6 UB, 16/03/09: 198 UB, 7/6/09: 13.9 UB y 25/09/09: 11 UB, 4/3/10: 4.5 UB.

**El paciente inició tratamiento de PROFILAXIS CON ALTAS DOSIS DE FACTOR VIII en abril de 2011.**

***El paciente ha cumplido correctamente con el tratamiento y presenta muy buena evolución.***

***Se decide pasar a esquema de tratamiento ADVATE 5000 UI, tres veces por semana.***

**Rp/**

**ADVATE® 1000 UI**

**1 FRASCO = 60 (SESENTA)**

DR. GUILLERMO ARBESÚ  
MEDICO HEMATOLOGO  
M.P. 6072

Dr. Guillermo Arbesú  
Jefe de Servicio Hematología  
Hospital Humberto Notti