A

abanico aluvial. (*alluvial fan*) *Geol*. Acumulación de materiales detríticos en forma de abanico o segmento de cono, depositada por una corriente fluvial o torrencial, en sectores donde hay un cambio brusco de la pendiente, como es el límite entre una montaña y una llanura adyacente.
abrasión. (*abrasion*) *Geol.* Proceso destructor de índole mecánica, desarrollado en la superficie terrestre, ocasionado por fricción entre partículas durante su transporte.
acicular. (*acicular*) *Geol.* V. **hábito cristalino acicular**.
ácido, da (*acid*) 1. *Geol*. [magma, lava, roca] Que contiene más del 63% de sílice. || 2. *Med. Amb.* V. **lluvia ácida** y **niebla ácida**.
acreción. (*accretion*) 1. *Geol.* Crecimiento de una sucesión estratigráfica por sedimentación, capa a capa, que puede ser en sentido vertical (acreción vertical o agradación), o en sentido frontal (acreción frontal o progradación). || 2. (*accretion*) *Geol.* Adición de material a una placa.
actividad explosiva.(*explosive activity*) *Geol.* Actividad volcánica caracterizada por las emisiones explosivas.
actividad ígnea. (*igneous activity*) *Geol.* Conjunto de procesos referentes a la generación, el movimiento y la consolidación de los magmas dentro de la corteza terrestre.
acuífero.(*aquifer*) 1. *Geol.* Formación geológica fisurada o porosa saturada y con suficiente permeabilidad para permitir el flujo de agua en cantidades significativas hacia manantiales o hacia las captaciones usuales, como pozos o galerías. || 2. *Geol. por ext*. Parte permeable de la formación geológica.
adamantino, na. (*adamantine*) *Geol.* Que tiene las propiedades del diamante.
afanítica. (*aphanitic*) *Geol*. V. **textura afanítica**.
aglomerado. (*agglomerate*) 1. *Geol.* Rudita en la que los fragmentos de rocas que la componen están poco o nada cementados. Su equivalente cementado es el conglomerado. || 2. *Geol.* Material piroclástico, consolidado o no, en el que predominan los piroclastos redondeados de más de 64 mm de tamaño.
agregado cristalino. (*crystal aggregate*) *Geol*. Conjunto de cristales que han crecido juntos.
agua magmática. (*magmatic water*) *Geol.* Agua disuelta en un magma. V. **agua juvenil**.
albita.(*albite*) *Geol*. Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los tectosilicatos, grupo de los feldespatos y serie de las plagioclasas, de fórmula $NaAlSi_3O_8$, que puede contener hasta un 10% de molécula de anortita, $CaAl_2Si_2O_8$. Cristaliza en el sistema triclínico, en cristales prismáticos generalmente maclados, siendo frecuentes las maclas polisintéticas. Tiene una dureza de 6 a 6.5 y un peso específico de 2.60 a 2.64. Es incoloro o blanco, tiene raya blanca y brillo vítreo, es de transparente a translúcido y muestra una buena exfoliación. Se encuentra en rocas magmáticas

ácidas y en rocas metamórficas. Tiene gran importancia en la industria cerámica y en la fabricación de materiales refractarios. V. **plagioclasa** y **anortita**.

albitita. (*albitite*) *Geol*. Roca ígnea o metasomática compuesta esencialmente de albita.

albitización.(*albitization*) *Geol.* Proceso de enriquecimiento en albita generalmente causado por la acción de fluidos ricos en sodio sobre rocas preexistentes.

alunita. (*alunite*) *Geol.* Mineral de la clase de los sulfatos, de fórmula KAl3(SO4)2(OH)6, que cristaliza en el sistema trigonal. Tiene una dureza de 3.5 a 4 y un peso específico de 2.7 a 2.9. Presenta color blanco con diversas tonalidades, raya blanca y brillo vítreo o terroso, y es de transparente a translúcido. Se forma por alteración hidrotermal de rocas ricas en feldespatos. Fue utilizado en el pasado para la fabricación de alumbre.

ammonites. (*ammonite*) **1.** *Paleont*. Cada uno de los componentes del orden *Ammonoidea*, cuyos fósiles se encuentran en rocas mesozoicas. || **2**. *Geol.* Sinón., *improp*., de **ammonoideo**.

amorfo, fa.(*amorphous*) *Geol*. [mineral, materia sólida] Que no tiene una ordenación regular de los átomos o una estructura cristalina definida.

andesita. (*andesite*) *Geol.* Roca volcánica intermedia, generalmente porfídica, formada por plagioclasa ácida (oligoclasa o andesina) acompañada por uno o más minerales ferromagnesianos (hornblenda, biotita, ortopiroxeno o clinopiroxeno). Es el equivalente volcánico de la diorita. Se distingue del basalto por la naturaleza de la plagioclasa, que es andesina o menos cálcica.

anfíbol. (*amphibole*) *Geol.* Cada uno de los integrantes de un grupo de minerales pertenecientes a la clase de los silicatos y a la subclase de los inosilicatos, caracterizados estructuralmente por la existencia de cadenas dobles de tetraedros de sílice. Hay dos tipos: los rómbicos, como la antofilita, y los monoclínicos, como la hornblenda.

anticlinal. (*anticline*) *Geol.* Pliegue cuyo núcleo está constituido por las rocas estratigráficamente más antiguas. En general, es antiforme, aunque a veces puede ser sinforme).

antrópico, ca.(*anthropic*) *Geol.* [forma, material, acción o proceso] Derivado de las actividades humanas.

aragonito. (*aragonite*) *Geol*. Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula CaCO3, polimorfo de la calcita y de la vaterita, que cristaliza en el sistema rómbico, en cristales normalmente prismáticos y a veces en maclas pseudohexagonales. Da nombre a un grupo que incluye a diversos carbonatos isoestructurales como la estroncianita y la cerusita. Tiene una dureza de 3.5 a 4 y un peso específico de 2.94. Es incoloro o presenta color blanco, rosado, gris o amarillento; tiene raya blanca y brillo vítreo, y es de transparente a translúcido. Es metaestable a la temperatura y presión ambientales y estable en condiciones de presión moderadas. De él están formadas originariamente las conchas de muchos organismos, y termina transformándose en calcita durante el proceso de fosilización. V. **calcita**.

arco insular. (*insular arch*) *Geol*. Alineación de islas próximas paralela a una fosa oceánica, asociada con fenómenos sísmicos o volcánicos. V. **fosa oceánica**.

arco volcánico. (*volcanic arc*) *Geol*. Cadena de volcanes arqueada y desarrollada encima de una zona de subducción.
arena. (*sand*) *Geol.* Sedimento compuesto por granos minerales de tamaño entre 0.062 y 2 mm, que se origina por la meteorización de las rocas y que ha sido seleccionado por los agentes de transporte. Puede tener cualquier composición mineralógica.
arenisca. (*sandstone*) *Geol.* Roca terrígena consolidada, en la que el tamaño de grano varía entre 0.062 y 2 mm. Al ser la sílice el material más perdurable por su resistencia mecánica y química, la mayor parte de ellas están mayoritariamente compuestas por granos silíceos.
azurita. (*azurite*) *Geol.* Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula Cu3(CO3)2(OH)2, que cristaliza en el sistema monoclínico. Tiene una dureza de 3.5 a 4 y un peso específico de 3.7 a 3.9. Presenta color azul marino, raya azul clara y brillo vítreo, y es de transparente a translúcido. Se encuentra en las zonas de oxidación de yacimientos de cobre y se forma por alteración de los sulfuros de cobre. Es, junto con la malaquita, mineral mayoritario de las menas de cobre de los yacimientos del Cinturón cuprífero de Zaire-Zambia.

B

banda de cizalla. (*shear band*) *Geol*. Zona de cizalla de pequeño tamaño.
bandeado.(*layering*) *Geol*. Estructura de la rocas ígneas, especialmente básicas y ultrabásicas, consistente en la alternancia de capas de espesor variable (de centímetros a metros) con diferente composición mineralógica. La alternancia puede ser rítmica. Generalmente se debe a la acumulación gravitatoria de cristales de diferente densidad que precipitan a partir de un magma. Las rocas así producidas reciben el nombre de *rocas acumuladas* o *cumuladas*.
bandeado mineral. (*mineral layering*) *Geol*. Disposición en capas de espesor variable (de centímetros a metros) de la mineralización de un yacimiento o depósito mineral.
basalto. (*basalt*) *Geol.* Roca volcánica de color oscuro (en ocasiones, negra), con contenido en SiO2 entre el 45% y el 52%, con textura microcristalina o porfídica, que contiene plagioclasa cálcica y piroxenos, normalmente augita, con o sin olivino. Frecuentemente presenta magnetita o ilmenita accesorias. Se distingue de la andesita por la naturaleza de la plagioclasa, que es labradorita o más cálcica. Su equivalente plutónico es el gabro.
basamento. (*basement*) **1.** *Geol.* Conjunto de rocas que se sitúa bajo una cobertera sedimentaria y se comporta de manera competente durante la deformación cortical. Sinón.: **zócalo**. V. **cratón**. || **2**. *Geol.* Corteza continental generada durante un ciclo anterior al de la secuencia estratigráfica suprayacente, denominada cobertera. Sinón.: **zócalo**. V. **cratón**.
básico, ca. (*basic*) *Geol*. [magma, lava, roca] Que contiene entre el 45 y el 52% de sílice.

biotita. (*biotite*) *Geol.* Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los filosilicatos y grupo de las micas, de fórmula $K(Mg,Fe^{2+})3(Al,Fe^{3+})Si3O10\ OH,F)2$, con impurezas de titanio, sodio, vanadio, litio, manganeso, bario, estroncio y cesio, que cristaliza en el sistema monoclínico y que generalmente se presenta en agregados hojosos que forman láminas flexibles y elásticas. Tiene una dureza de 2.5 a 3 y un peso específico de 2.7 a 3.3. Presenta color negro, castaño o verdoso, raya blanca y brillo vítreo o submetálico, y es de transparente a translúcido. Se encuentra en múltiples tipos de rocas, entre ellas muchas ígneas (granitos, sienitas y dioritas), metamórficas (esquistos y gneises) y sedimentarias (detríticas). Sinón.: **mica negra**.
bitumen. (*bitumen*) *Geol.* Hidrocarburo natural sólido o semisólido, de color negro o pardo oscuro, inflamable. Incluye a los asfaltos, las ceras resinosas y los productos afines.
blasto. (*blast*) *Geol.* Cristal de una roca metamórfica que ha crecido durante el metamorfismo.
blasto-(*blast-*) 1. *Geol.* Prefijo que alude a la textura (relicta) del protolito de una roca metamórfica (p ej. blastoporfídica). || 2. *Geol.* Prefijo que alude a la concurrencia de blastésis (recristalización) y deformación intensa de cizalla en rocas de falla (p. ej. blastomilonita).
botroidal. (*brotyoidal*) V. **textura botroidal**.
brecha.(*breccia*) 1. *Geol.* Roca clástica compuesta por elementos de diversos tamaños de forma angulosa, dispuestos irregularmente y cementados por una masa microcristalina o amorfa. o una matriz detrítica fina. || 2. *Geol.* Roca sedimentaria constituida, en más de un 50 %, por elementos detríticos angulosos de más de 2 mm de diámetro y trabados por un cemento o una matriz detrítica fina. V. **rudita**.
brecha sedimentaria.(*sedimentary breccia*) *Geol.* Brecha formada en procesos sedimentarios, en contraste con las brechas tectónicas y las volcánicas.
brecha tectónica. (*tectonic breccia*) *Geol.* Sinón. de **brecha de falla**.
brecha volcánica.(*volcanic breccia*) *Geol.* Brecha constituida por fragmentos de rocas volcánicas, incluyendo fragmentos de lava solidificada y de material arrancado de los conductos volcánicos durante las erupciones.
brechificación. (*brecciation*) *Geol.* Proceso de formación de una brecha.
buzamiento. (*dip*) *Geol.* Ángulo que forma la línea de máxima pendiente de una superficie (estrato, capa, filón o falla) con su proyección sobre el plano horizontal. Sinón.: **buzamiento real**.
cabalgamiento. (*overthrust fault*) *Geol.* Falla inversa de bajo ángulo (menor de 45º) en la que el bloque de techo se sitúa encima del bloque hundido.
cabeceo. (*pitch, rake*) *Geol.* Ángulo menor que forma un elemento estructural rectilíneo contenido en un plano con las rectas horizontales de dicho plano. Dado que en cada caso pueden existir dos líneas diferentes con el mismo cabeceo, para resolver la ambigüedad debe especificarse desde qué semirrecta de la horizontal se comienza a medir el ángulo, lo cual puede hacerse, p. ej. indicando un punto cardinal que indique una dirección próxima a la de la semirrecta..
calcita. (*calcite*) *Geol.* Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula CaCO3, que cristaliza en el sistema trigonal, que unas veces se encuentra formando romboedros o

escalenoedros y otras, agregados cristalinos masivos, fibrosos o fibroso-radiados. Es polimorfo del aragonito y de la vaterita y da nombre a un grupo que incluye a diversos carbonatos isoestructurales como la rodocrosita, la magnesita y la smithsonita. Tiene una dureza de 3 (es el tercer término de la escala de Mohs) y un peso específico de 2.7. Es incolora o presenta color blanco con tonalidades diversas (blanco, amarillo, rojizo, gris, etc.), raya blanca y brillo vítreo, y es de transparente a opaco. Es un componente esencial de algunas rocas sedimentarias (calizas) y carbonáticas metamorfizadas (mármoles). Se forma por precipitación química en soluciones sobresaturadas en diferentes medios acuosos y a partir de caparazones de organismos. También se encuentra en filones hidrotermales y en pegmatitas. Se utiliza en la fabricación de cementos y de fertilizantes y también como piedra ornamental. V. **espato de Islandia, aragonito, vaterita**.

caliza.(*limestone*) *Geol.* Roca sedimentaria cuyo origen puede ser predominantemente biológico, químico o mixto. La variedad pura tiene, al menos, un 95% de CaCO3; la corriente, por lo menos un 50%; de los componentes restantes, el más frecuente y dominante es el carbonato de magnesio, y los accesorios son silicatos o productos de su alteración, como arcillas, sílice, y también pirita y siderita.

Cámbrico. (*Cambrian*) *Geol.* Primero en antigüedad de los seis períodos en que se divide el Paleozoico. Abarca aproximadamente desde los 542 a los 488.3 Ma antes de los tiempos actuales.

carbón mineral.(*coal*) *Geol.* Carbón natural, sólido y combustible, de color pardo a negro y de consistencia pétrea o terrosa, constituido por carbono amorfo acompañado de hidrocarburos, compuestos orgánicos complejos y materiales inorgánicos. Tiene su origen en la carbonificación de vegetales en épocas geológicas pasadas, tras quedar sepultados en ambientes anóxicos. Según el porcentaje de carbono fijo, se denomina turba, lignito, hulla o antracita.

Carbonífero. (*Carboniferous*) *Geol.* Quinto en antigüedad de los seis períodos en que se divide el Paleozoico. Abarca, aproximadamente, entre los 359.2 y los 299 Ma antes de los tiempos actuales. Se subdivide en dos épocas: Misisipiense y Pensilvaniense.

celda cristalina.(*crystal cell*) *Geol.* Paralepípedo definido por tres vectores independientes de periodicidad del cristal (llamados vectores de traslación). Motivo que, por repetición en las tres direcciones del espacio, origina el cristal completo. Sinón.: **celda unidad**.

cementación. (*cementation*) 1. *Geol.* Proceso diagenético mediante el cual se produce una precipitación en los sedimentos, a partir de los materiales disueltos en las aguas intersticiales, rellenando parcial o totalmente los huecos. Conlleva un endurecimiento, con la consiguiente transformación del sedimento en roca sedimentaria. || 2. *Paleont*. Alteración tafonómica de los restos organógenos por adición de sustancias minerales. Comprende procesos como la permineralización de tejidos, la formación de concreciones fosilíferas, o el relleno de las cavidades de los restos organógenos por sustancias minerales

ciclo geológico. (*geological cycle*) *Geol.* Ciclo constante de creación y destrucción experimentado por la Tierra. V. **ciclo geológico externo**, **ciclo geológico interno**.

ciclo geológico externo. (*external geological cycle*) *Geol*. Parte del ciclo geológico que tiene lugar en la superficie de la Tierra, que comprende la meteorización, el transporte, la sedimentación y la diagénesis.
ciclo geológico interno. (*internal geological cycle*) *Geol*. Parte del ciclo geológico que tiene lugar en el interior de la Tierra, que comprende los procesos magmáticos y metamórficos y los procesos magmáticos, metamórficos, tectónicos y sísmicos.
ciclo hidrológico. (*hydrological cycle*) *Geol*. Ciclo que comprende las migraciones y transformaciones del agua desde su evaporación a partir de los océanos hasta la llegada de nuevo a dichos océanos a través de la precipitación, de los ríos, las aguas subterráneas o los glaciares.
ciclo sedimentario.(*sedimentary cycle*) 1. *Geol.* Secuencia de estratos (o de procesos sedimentarios) relacionados entre sí, que se repiten en el mismo orden en una sucesión estratigráfica. || 2. *Geol.* Secuencia de sedimentos que comprende los depósitos correspondientes a una transgresión marina y a la regresión sucesiva.
ciencias de la Tierra. (*earth sciences*) *Geol*. Conjunto de ciencias que estudian la Tierra en todas sus fases, sólida, líquida y gaseosa.
cizallamiento. (*shear*) *Geol.* Deformación producida en una roca por fractura y desplazamiento según el plano de dicha fractura.
clivaje. (*cleavage*) 1. *Geol.* Hendidura en un cristal con la formación de dos superficies lisas. Se produce en planos cristalinos. || 2. *Geol.* Foliación tectónica definida por filosilicatos pequeños o por láminas orientadas constituidas habitualmente por material más oscuro que el resto de la roca.
colada aa. (*aa lava flow*) *Geol*. Tipo de colada de lava de origen hawaiano, de superficie irregular, rugosa, con bloques (de centimétricos a métricos) de forma irregular y lados afilados. [Del hawaiano 'A'ā, "pedregosa con lava áspera", y también "fuego"]
colada en bloques. (*block lava*) *Geol.* Colada cuya superficie está formada por grandes bloques de tamaño métrico. Suelen formarse en lavas viscosas.
cola de presión. (*pressure fringe*) *Geol.* En una roca deformada, agregado de cristales que se forma junto a dos caras opuestas de un cristal en las cuales existe un déficit de esfuerzo compresivo. Sinón.: **sombra de presión**.
colada de ceniza. (*ash flow*) *Geol.* Colada piroclástica formada mayoritariamente por cenizas.
colada de detritos. (*debris flow*) *Geol*. Mezcla de material suelto, saturado en agua, poco seleccionado que se moviliza pendiente abajo en laderas de montañas o en fondos marinos.
colada de lava. (*lava flow*) *Geol.* Masa fluida de lava que sale por un cráter y que fluye por las laderas de un volcán. Sinón.: **flujo de lava, corriente de lava**.
colada de lodo.(*mudflow*) *Geol*. Flujo de material arcilloso no consolidado a lo largo de una pendiente.
colada piroclástica. (*pyroclastic flow*) 1. *Geol*. Flujo denso de material volcánico originado en una erupción volcánica y constituido esencialmente por fragmentos calientes de vidrio volcánico, pómez, fragmentos de rocas y gas, que se desplaza

rasante sobre la ladera de un volcán y tiende a acumularse en las zonas más bajas del mismo || 2. *Geol.* Depósito originado en el proceso descrito [acep. 1].
colisión.(*collision*) *Geol.* Convergencia de dos placas tectónicas hasta producir el cierre del océano situado entre ambas. Puede haber colisión entre dos continentes o entre un arco de islas y un continente, o entre dos arcos de islas.
compactación.(*compaction*) *Geol.* Proceso diagenético en el que los sedimentos pierden progresivamente espesor, al ser comprimidos por los materiales superpuestos y perder agua intersticial.
comportamiento dúctil. (*ductile behavior*) *Geol.* Comportamiento de una roca que tiene deformación dúctil frente a los esfuezos, caracterizado por presentar una capacidad para sufrir deformación permanente sin pérdida de su capacidad para resistir un esfuerzo creciente.
comportamiento elástico. (*elastic behavior*) *Geol.* Comportamiento que presenta un cuerpo frente a los esfuerzos, caracterizado por la recuperación de su configuración inicial cuanto se eliminan los esfuerzos aplicados.
comportamiento frágil. (*brittle behavior*) *Geol.* Comportamiento de una roca que pierde su cohesión interna cuando supera su límite de elasticidad.
conglomerado. (*conglomerate*) *Geol.* Roca sedimentaria constituida, en más de un 50%, por elementos detríticos redondeados de más de 2 mm de diámetro y trabados por un cemento o una matriz detrítica fina. V. **rudita**.
cono de lava. (*lava cone*) *Geol.* Acumulación de lava viscosa con forma de cono y flancos cóncavos.
continente. (*continent*) 1. *Geol.* Área de grandes dimensiones, constituida por corteza continental y, en parte emergida, actual o antigua, incluyendo sus márgenes. || 2. *Geogr.* Cada una de las grandes divisiones de las tierras emergidas, separadas entre sí por océanos.
cordillera.(*cordillera*) *Geol.* Conjunto de montañas enlazadas y alargadas que presentan rasgos genéticos comunes y una dirección común que se prolonga centenares, o incluso millares, de kilómetros. Sinóns.: **cadena de montañas**, **sistema montañoso**.
corneana. (*hornfelds*) *Geol.* Roca metamórfica originada por metamorfismo de contacto, masiva, muy dura y recristalizada, de grano fino a medio, y que carece de planos de exfoliación. V. **facies de las corneanas de albita-epidota**, **facies de las corneanas hornbléndicas** y **facies de las corneanas piroxénicas**.
corteza. (*Earth crust*) *Geol.* Capa superior sólida del globo terráqueo que yace sobre el manto separada de éste por la superficie de Mohorovicic. Constituye el 1 por 1 000 del volumen de la Tierra, con un grosor que varía desde 6 km en el centro de los océanos hasta 60 km bajo algunos relieves montañosos. Su composición y estructura es diferente en continentes y océanos. Sinón.: **corteza terrestre**.
corteza continental.(*continental crust*) *Geol.* Parte de la corteza terrestre correspondiente a los continentes, con un espesor medio de 30 km, constituida por rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas ígneas, con una densidad de unos 2 700 kg/m^3.

corteza inferior.(*lower crust*) *Geol.* Parte inferior de la corteza continental, con densidad alta y composición básica o granulítica.
corteza oceánica. (*oceanic crust*) *Geol.* Parte de la corteza terrestre correspondiente a los océanos, con un espesor medio de 6-7 km, constituida esencialmente por basaltos, gabros y sedimentos principalmente pelágicos.
corteza superior. (*upper crust*) *Geol.* Parte superior de la corteza continental, de composición global granítica, estructura compleja y comportamiento mecánico general de tipo frágil.
corteza terrestre. (*Earth's crust*) *Geol.* Sinón.: de **corteza**.
Cretácico. (*Cretaceous*) *Geol.* Tercero en antigüedad de los tres períodos en que se divide el Mesozoico. Abarca aproximadamente entre los 145.5 y los 65 Ma antes de los tiempos actuales.
cristal. (*crystal*) *Geol.* Sustancia sólida o raramente líquida de composición química definida que produce el fenómeno de la difracción si es irradiada con rayos-X.
cristalización. (*crystallization*) *Geol.* Formación de cristales a partir de sustancias que se encuentran en otro estado físico (líquido, gas o disolución). Se puede obtener por solidificación, evaporación o enfriamiento de soluciones saturadas, o muy concentradas, por precipitación o por sublimación y condensación.
cuarzo. (*quartz*) *Geol.* Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los tectosilicatos, grupo de la sílice, de fórmula SiO2, polimorfo con la cristobalita y la tridimita, que se presenta bajo dos formas, una de alta y otra de baja temperatura. El cuarzo-αes estable por debajo de 573ºC y cristaliza en el sistema trigonal en forma de cristales prismáticos de hábito hexagonal apuntados por pirámides. El cuarzo-β es estable por encima de 573ºC y cristaliza en el sistema hexagonal. Tiene una dureza de 7 (es el séptimo término de la escala de Mohs) y un peso específico de 2.65. Generalmente, es incoloro o blanco, pero, debido a las impurezas, puede presentar cualquier color: hialino (cristal de roca), blanco (cuarzo lechoso), amarillo (cuarzo citrino), de gris a negro (cuarzo ahumado), violeta (amatista) o rojo (jacinto de Compostela). Tiene fractura concoide y brillo vítreo, y es de transparente a translúcido. Se ha obtenido, además, artificialmente en el laboratorio. Es el mineral más abundante de la corteza terrestre y se encuentra en rocas magmáticas ácidas y metamórficas, y en las sedimentarias detríticas, debido a su gran resistencia a la meteorización. Presenta numerosas variedades micro y criptocristalinas: jaspe, calcedonia, sílex, etc. Tiene múltiples usos industriales y en joyería.

D

datación. (*dating*) *Geol.* Asignación de edad o época, relativa (por correlación) o numérica (en años por indicadores fisico-químicos), a una formación o proceso geológico, roca, mineral, agua o fósil
deformación.(*deformation*) 1. *Geol.* Transformación de un medio continuo que se produce como consecuencia de la actuación de esfuerzos, y que lleva consigo un

cambio en la forma y posición de este entre una configuración inicial –no deformada– y una configuración final –deformada–. || 2. *Geol.* Var. de **deformación interna**.
depósito. (*deposit*) 1. *Geol*. Sinón. de **deposición**. || 2. *Geol*. Sinón. de **sedimento**, acep. 2.
depósito mineral. (*mineral deposit*) Sinón. de **criadero mineral**.
derrubio. (*debris*) *Geol.* Conjunto de fragmentos de roca desplazados por la gravedad o por el efecto de los agentes atmosféricos, corrientes de agua, etc., hasta acumularse en las laderas o en la base de una zona inclinada.
detrito. 1. *Geol.* Sinón. de **clasto**. || 2. (*detritus*) *Geol*. Producto sólido, resultante de la destrucción de una roca anterior por agentes físicos, que puede ser transportado. || 3. *Ecol.* Partícula de materia orgánica procedente de la disgregación o descomposición de restos animales o vegetales.
diaclasa.(*joint*) *Geol.* Fractura que separa en dos partes una masa de roca, sin que se produzca desplazamiento a lo largo de ella.
dique. 1. (*dike, dyke*) *Geol.* Intrusión tabular de roca ígnea que rellena una fractura o discontinuidad y en general corta la estratificación o la foliación. || 2. (*dike ridge*) *Geogr*. Relieve en forma de cresta que se forma paralelamente a un cauce fluvial, a ambos lados de este, constituido fundamentalmente por arena fina y arcilla.
domo. 1. (*dome*) *Geol*. Forma cristalina constituida por dos planos que se cortan formando un diedro y que son simétricos respecto a un plano, con forma de tejado. || 2. (*dome*) *Geol.* Antiforme con sección horizontal circular o elíptica, y con buzamientos hacia fuera de la estructura. || 3. (*lava dome*) *Geol*. Cuerpo rocoso volcánico o subvolcánico con forma abovedada, originado por acumulación de lava muy viscosa.
dorsal oceánica. (*oceanic ridge*) 1. *Geol*. Cordillera submarina de miles de kilómetros de longitud y centenares de kilómetros de anchura, situada en un borde divergente de placas, que se eleva hasta 2-3 km por encima de las llanuras abisales de los fondos oceánicos, y en cuyo centro hay una zona deprimida a través de la cual sale material ígneo procedente del manto que al solidificarse, ocasiona el crecimiento de la corteza oceánica. || 2. *Geol*. Zona de formación de yacimientos de sulfuros masivos, de pizarras negras, nódulos de manganeso y de cromititas.

E

edad relativa.(*relative age*) *Geol.* Edad de una roca, fósil o de un suceso geológico expresada en relación (más antigua o más moderna) con otras rocas, fósiles o sucesos.
endógeno, na. (*endogenous*) *Geol*. [proceso, fenómeno, roca] Que ocurre o se forma en el interior de la Tierra.
energía geotérmica. (*geothermal energy*) *Med. Amb., Geol.* Energía originada en el interior de la corteza terrestre en forma de calor, que puede ser aprovechada en

superficie, directamente o mediante un proceso de conversión, para la producción de calor o de energía eléctrica. V. **energía alternativa** y **energía renovable**.
eón.(*eon*) *Geol.* Unidad geocronológica de rango máximo que comprende varias eras geológicas. Se corresponde con el eonotema. V. **unidad geocronológica**.
época. (*epoch*) 1. *Geol.* Referencia temporal utilizada para definir con precisión el instante en que tiene lugar algún fenómeno u observación en una escala de tiempo determinada. || 2. *Geol.* Unidad geocronológica, subdivisión de un período geológico. V. **unidad cronoestratigráfica**.
era. (*era*) *Geol.* Unidad geocronológica de rango mayor, subdivisión de un eón, que comprende varios períodos.
erosión.(*erosion*) *Geol*. Fenómeno de descomposición y desintegración de materiales por acciones mecánicas, químicas y biológicas. V. **ciclo de erosión**.
erupción.(*eruption*) 1. *Geol.* Salida incontrolada y brusca de un fluido en un sondeo. Si se trata de fluidos inflamables (gas, petróleo), puede producirse con frecuencia un incendio. Para prevenirla se sitúan unas válvulas de seguridad en la boca del pozo. || 2. *Geol.* V. **erupción volcánica**.
escala de Mohs. (*Mohs scale*) *Geol.* Escala de dureza de los minerales que consta de diez términos, a cada uno de los cuales se le atribuye una dureza, del 1 al 10. Son: 1, talco; 2, yeso; 3, calcita; 4, fluorita; 5, apatito; 6, ortosa; 7, cuarzo; 8, topacio; 9, corindón; 10, diamante. Cada uno de estos minerales puede rayar a los de dureza menor y, a su vez, es rayado por los de dureza mayor. Sinón.: **escala de dureza**.
esquistosidad. (*schistosity*) 1. *Geol.* Fábrica plana anisótropa definida dominantemente por filosilicatos de gran tamaño (visibles a simple vista) y en la que la mayoría de los granos presentan un orientación preferente de su dimensión mayor. || 2. *Geol.* Sinón. *ant.* de **foliación** (acep. 1).
estratigrafía. (*stratigraphy*) *Geol.* Parte de la geología que estudia e interpreta los procesos registrados en las sucesiones sedimentarias, que permite conocer la naturaleza y disposición de las rocas estratificadas, la correlación tanto de los materiales como de los sucesos, y la ordenación temporal correcta de la secuencia de materiales y sucesos.
estrato. (*bed, stratum*) *Geol.* Nivel de roca o sedimento que se depositó en un intervalo de tiempo concreto y que queda delimitado por superficies (denominadas *superficies de estratificación*), originadas por cambios en la sedimentación, por interrupciones sedimentarias o por ambos factores a la vez.
extrusión. (*extrusion*) 1. *Geol.* Emisión de lava desde una boca eruptiva o fisura en la superficie de la Tierra || 2. *Geol.* Penetración una roca incompetente (arcilla con evaporitas) en las capas suprayacentes hasta la hasta la superficie topográfica u a otra superficie.
extrusiva. (*extrusive*) *Geol.* V. **roca extrusiva**.

F

fábrica.(*fabric*) 1. *Geol.* Configuración espacial y geométrica completa de todos los componentes y elementos de una roca que se desarrollan de forma penetrativa a través del volumen de la roca considerada. || 2. *Geol.* Orientación relativa de partes de una masa de roca. **falla**. (*fault*) *Geol.* Fractura o zona de fracturas a lo largo de cuya superficie se produce un desplazamiento relativo de los dos bloques (*labios*) en que quedan divididas las rocas afectadas. **falla activa**. (*active fault*) *Geol.* Falla en la que el movimiento relativo ha ocurrido recientemente y es muy probable que ocurra en el futuro próximo.
falla dextra. (*dextral fault*) *Geol.* Falla de desgarre en la que un bloque se desplaza hacia la derecha del bloque desde donde se hace la observación. Vista desde arriba, los bloques se mueven en el sentido de las agujas del reloj. Sinón.: **falla dextrorsa**.
falla directa. (*direct fault*). Sinón. de **falla normal**.
falla inversa. (*reverse fault*) *Geol.* Falla inclinada cuyo bloque elevado es el superior y su superficie de falla buza hacia la posición del bloque elevado.
falla normal. (*downship fault, normal fautt*) *Geol.* Falla cuyo bloque elevado es el inferior y su superficie buza hacia el bloque hundido. Sinón.: **falla directa**.
falla rotacional.(*rotational fault*) *Geol.* Falla cuyo movimiento implica una rotación de un bloque respecto del otro.
falla sinistra. (*sinistral fault*) *Geol.* Falla de desgarre en la que un bloque se desplaza hacia la izquierda del bloque desde donde se hace la observación. Vista desde arriba, los bloques se mueven en sentido contrario al de las agujas del reloj. Sinon.: **falla sinistrorsa**.
falla transcurrente. (*transcurrent fault*) *Geol.* Sinón.: de **falla de desgarre**.
falla de transferencia. (*transfer fault*) *Geol.* Falla lateral simultánea al desarrollo de otras estructuras, que pone en contacto dos bloques que pueden tener diferentes estructuras.
falla transformante. (*transform fault*) *Geol.* Falla que define el límite entre dos placas en el que no hay ni creación ni destrucción de corteza oceánica, sino que sólo hay un desplazamiento horizontal que coincide con la dirección de la falla. Se asocia con otros tipos de límites de placas (p. ej. con dorsales, o con zonas de subducción, o con un límite de cada tipo) para formar sistemas transformantes.
Fanerozoico. (*Phanerozoic*) *Geol.* Eón más moderno de los tres en los que se divide la historia geológica, con el significado de vida manifiesta. Comprende los últimos 542 Ma de la historia de la Tierra. Se subdivide en tres eras: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. **fanerocristalino.** (*phanerocrystalline*) *Geol.* V.
agregado fanerocristalino. **feldespato**. (*feldspar*) *Geol.* Cada uno de los minerales que integra un grupo, dentro de la clase de los silicatos y la subclase de los tectosilicatos, que son silicatos alumínicos de potasio, sodio y calcio, entre los que se encuentran la ortosa y las plagioclasas. **félsico**. (*felsic*) *Geol.* [Mineral, magma o roca ígnea] Que

contiene cuarzo y minerales de color claro. P. ej. los feldespatos, los feldespatoides y el cuarzo.
fenocristal. (*phenocryst*) *Geol.* Cristal de tamaño perceptiblemente más grande que los que forman la mesostasis, en una roca ígnea. Cuando es mayor de 4-5 cm se suele llamar *megacristal*.
filita. (*phyllite*) *Geol.* Roca metamórfica de grano fino caracterizada por una apariencia lustrosa y una esquistosidad bien definida que resulta de la orientación preferente de filosilicatos. Generalmente, las filitas son rocas de grado metamórfico bajo.
filón. (*vein*) *Geol.* Relleno mineral de una fractura.
fluido hidrotermal. (*hydrothermal fluid*) *Geol.* Líquido o disolución acuosa que circula por el interior de la litosfera y que está ligado a las etapas finales del vulcanismo o a la fase final de la cristalización magmática.
flujo piroclástico. (*pyroclastic flow*). *Geol.* Sinón. de **colada piroclástica**, acep. 1.
forma cristalina. (*crystalline form*) *Geol.* Conjunto de caras de un cristal relacionadas entre si por los elementos de simetría del grupo puntual al que pertenece el cristal.
fosa. (*graben*) *Geol.* Sinón. de **graben**.
fosa oceánica. (*oceanic trench*) *Geol.* Depresión submarina estrecha y alargada de grandes dimensiones, con centenares o miles de kilómetros de longitud y con profundidades de 5 a 11 km, que se localiza en los límites de placas donde hay destrucción de corteza oceánica por subducción.
fósil guía. (*guide fossil*) *Paleont., Geol.* Sinón. de **fósil característico**.
fractura frágil. (*brittle fracture*) *Geol.* Fractura que se produce bruscamente con pérdida completa de la cohesión del material. Generalmente, se produce después de una deformación dúctil pequeña o nula.



gabro.(*gabbro*) *Geol.* Roca plutónica compuesta de principalmente de plagioclasa cálcica y clinopiroxeno o ortopiroxeno, con o sin olivino o anfíbol. Es el equivalente intrusivo del basalto. Se distingue de la diorita por la naturaleza de la plagioclasa, que es de mayor contenido en calcio que en sodio.
géiser.(*geyser*) *Geol.* Fuente natural que lanza una columna de agua caliente o de vapor de agua a intervalos generalmente regulares.
gelifracción. (*gelifraction*) *Geol.* Sinón. de **gelivación**.
gelivación.(*gelivation*) *Geol.* Rotura o desintegración mecánica de una roca o del suelo, debida a la presión ejercida por el agua contenida en poros y grietas al congelarse. Sinóns.: **gelifracción, crioclastia**.
geocronología. (*geochronology*) *Geol.* Parte de la geología que estudia la edad absoluta o numérica y la relativa de las rocas y de los acontecimientos que han sucedido en la historia de la Tierra.
geología. (*geology*) 1. *Geol.* Ciencia que estudia la composición, estructura, morfología y edad de los materiales que componen la Tierra, en especial, a partir de la observación en las partes accesibles. Se ocupa además de la elaboración de

hipótesis que permitan reconstruir la historia y la evolución de la Tierra. V. **ciencias geológicas**. || 2. *Geol.* Por ext. Estudio de la composición de planetas y satélites distintos a la Tierra. V. **geología planetaria**.
gneis. (*gneiss*) *Geol.* Roca metamórfica que presenta estructura gneísica. V. **estructura gneísica**.
Gondwana. (*Gondwanaland, Gondwana*) *Geol.* Continente austral que existió a finales del Paleozoico y principios del Mesozoico, de cuya fragmentación posterior resultaron los dominios cratónicos de Sudamérica, África, Antártida, Australia e India.
granito.(*granite*) *Geol.* Roca plutónica de textura granuda, compuesta por cantidades similares de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa sódica como minerales esenciales, y cantidades menores de uno o más minerales, como biotita, moscovita, hornblenda o granate.
granitoide. (*granitoid*) *Geol.* Familia de rocas granudas intrusivas, desde el gabro hasta el granito; incluye la tonalita, la granodiorita y el granito.
grano. (*grain*) *Geol.* Mineral detrítico o fragmento de roca de tamaño arena.
granulometría. (*granulometry*) *Geol.* Medida de las dimensiones y los porcentajes de las partículas o granos de una sustancia granulosa cualquiera, que se aplica a los sedimentos detríticos no compactados.
grava. (*gravel*) *Geol.* Rudita constituida por cantos o guijarros sin cementar.

H

hábito cristalino acicular.(*acicular crystal habit*) *Geol.* Hábito de los cristales que presentan un marcado desarrollo en la dirección de uno de los ejes cristalográficos, y que adoptan el aspecto de agujas.
hábito cristalino masivo.(*massive crystal habit*) *Geol.* Hábito de los cristales que no presentan un desarrollo preferente en ninguna de las direcciones de sus ejes cristalográficos, con caras y aristas mal definidas y que no poseen, por lo tanto, simetría externa aparente.
hábito cristalino planar. (*planar crystal habit*) *Geol.* Hábito en el que los cristales apenas tienen espesor y se presentan en láminas muy delgadas.
hábito cristalino prismático. (*prismatic crystal habit*) *Geol.* Hábito de los cristales que presentan un desarrollo preferente según la dirección de uno de sus ejes cristalográficos, siendo la sección perpendicular a este eje un polígono.
hábito cristalino tabular.(*tabular crystal habit*) *Geol.* Hábito de los cristales que presentan gran desarrollo en las direcciones de dos ejes cristalográficos, y que están muy poco desarrollados en la dirección del tercero.
hidrosfera. (*hydrosphere*) *Geol.* Conjunto de aguas superficiales que cubre gran parte de la superficie terrestre (mas de 2/3), formado por los mares, lagos, ríos, glaciares, etc.
hidrotermal.(*hydrothermal*) *Geol.* [proceso, origen, filón, mineralización] Formado por fluidos hidrotermales. V. **diferenciación hidrotermal**, **fluido hidrotermal**, **fuente hidrotermal, metamorfismo hidrotermal** y **yacimiento hidrotermal**.

hipoabisal. (*hypabyssal*). *Geol.* V. **roca hipoabisal**.
Holoceno. (*Holocene*) *Geol.* Época más reciente de las dos que componen el Cuaternario, correspondiente al período interglaciar actual, que abarca los últimos 11 600 años y se caracteriza por la desaparición de los grandes inlandsis. Durante ella) se desarrollaron las culturas Mesolítica, Neolítica, Calcolítica, del Bronce, del Hierro, Romana, Medieval y Moderna, según la cronología arqueológica.
holocristalina. (*holocrystalline*) V. **textura holocristalina**.

I

ígnea. (*igneous*) *Geol.* V. **roca ígnea**.
intrusión. (*intrusion*) 1. *Geol.* Masa pétrea o magmática de poca profundidad, que rellena las grietas u oquedades en terrenos sedimentarios. || 2. *Geol.* Proceso por el que se introduce a presión una roca ígnea en una formación geológica preexistente.

J

Jurásico. (*Jurassic*) *Geol.* Segundo en antigüedad de los tres períodos en que se divide el Mesozoico. Abarca aproximadamente entre los 199.6 y los 145.5 Ma antes de los tiempos actuales.

L

lacolito. (*laccolith*) *Geol.* Intrusión magmática de forma lenticular, convexa hacia el techo, generalmente concordante con la estratificación, de hasta algunos kilómetros de diámetro como máximo. En la base suele tener un canal de alimentación por el que se une a una cámara magmática más profunda. Los lacolitos suelen estar formados por rocas graníticas.
ladera. (*slope*) *Geol.* Forma simple constituida por una unidad morfológica inclinada. Ocupan la mayor parte de la superficie terrestre.
lahar. (*lahar*) *Geol.* Colada de barro de origen volcánico, directo o indirecto, que fluye por las laderas de los volcanes, siguiendo normalmente los cauces de los ríos o de los arroyos.
laminación. (*lamination*) *Geol.* Disposición en láminas de una roca sedimentaria.
lava.(*lava*) *Geol.* Material fundido viscoso que es expulsado al exterior por un volcán, a elevada temperatura, en el curso de una erupción. Al enfriarse da lugar a la formación de rocas efusivas o a escorias volcánicas.
leuco-(*leuco-*) *Geol.* Prefijo que indica que una roca tiene un índice de color menor que el que le corresponde. V.: **índice de color**.
limo. (*silt*) *Geol.* Sedimento detrítico fino cuyas partículas tienen un tamaño medio comprendido entre 4 y 62 µm.

limolita. (*siltstone*) *Geol.* Roca sedimentaria formada por la compactación de un limo.
lineamiento. (*lineament*) *Geol*. Rasgo rectilíneo o ligeramente curvado de la superficie terrestre, visible fundamentalmente en las imágenes de satélite. Su significación es, en general, de tipo morfológico. Sus dimensiones son regionales y probablemente refleja un fenómeno o anomalía profundos. Pueden ser simples o compuestos (constituidos por segmentos alineados).
litología. (*lithology*) *Geol.* Sinón. de **petrología.**
litosfera. (*lithosphere*) 1. *Geol*. Parte sólida que cubre la superficie de la Tierra, en oposición a hidrosfera y atmósfera. || 2. *Geol.* Capa superior de la Tierra sólida que comprende la corteza terrestre (tanto corteza continental como corteza oceánica) y la parte frágil del manto superior. Su base está definida por una temperatura de entre 1 200ºC y 1 300ºC, y su espesor medio está alrededor de 100 km. A escala global, está dividida en diferentes láminas sólidas y relativamente rígidas, denominadas *placas*. V. **placas,** acep. 2.
lutita. (*lutite*) *Geol.* Roca sedimentaria constituida por granos muy finos, de menos de 0.062 mm. Sinón.: **pelita**.

M

macizo. 1. (*massif*) *Geol*. Sistema montañoso amplio y bien definido, generalmente constituido por rocas más antiguas y más rígidas que las que lo rodean.
|| 2.(*orebody*) *Geol.* Bloque de mineral delimitado para su posterior explotación minera o para otros fines.
magma. (*magma*) *Geol.* Material rocoso fundido móvil, fluido o pastoso, con gases disueltos y silicatos sólidos en suspensión, generado en el interior de la Tierra y susceptible de intruir y ser extruido. Es el material del que, por consolidación, derivan las rocas ígneas.
manto. 1 (*mantle*) *Geol.* Parte del interior de la Tierra comprendida entre la corteza y el núcleo, y cuyos límites están marcados por la discontinuidad de Mohorovičičy la discontinuidad de Gutenberg, respectivamente. Se divide en manto superior y manto inferior, separados por la zona de transición situada a 700 km de profundidad.
|| 2. (*nappe*) *Geol.* Sinón. de **manto de corrimiento**. || 3. (*manto*) *Geol.* Yacimiento mineral sensiblemente horizontal de forma tabular, generalmente confinado en un horizonte estratigráfico.
manto inferior.(*lower mantle*) *Geol.* Parte del manto comprendida entre la zona de transición −localizada a unos 700 km de profundidad− y el límite con el núcleo terrestre (discontinuidad de Güttenberg) a unos 2 900 km.
manto superior.(*upper mantle*) *Geol.* Parte del manto comprendida entre su límite con la corteza (discontinuidad de Mohorovičić) y la zona de transición localizada a unos 700 km de profundidad.
mapa geológico.(*geologic map*) *Geol.* Representación, sobre base topográfica de un sector, de los materiales que afloran en el mismo, los tipos de contactos entre ellos y las estructuras presentes.

margen activo. 1.(*active margin*) *Geol.* Margen continental con deformación y actividad sísmica significativa. || 2. (*convergent margin*) *Geol.* Margen localizado en un borde de un continente sobre un límite de dos placas jalonado por una zona de subducción. Responde al modelo de margen continental de la mayoría de los bordes actuales del Pacífico. Sinón.: **margen convergente**. || 3. (*conservative margin*) *Geol.* Margen continental que coincide con un límite de placas transcurrente, es decir, con una falla transformante.

margen continental.(*continental margin*) 1*. Geol.* Área localizada en la prolongación de los continentes bajo el agua de los mares y océanos en la que se pueden acumular importantes volúmenes de sedimentos, en unos sectores sobre la corteza continental y en otros sobre la corteza oceánica adyacente. Pueden coincidir con un límite de placa convergente (margen activo) o estar situada en el interior de una placa en un antiguo límite divergente (margen pasivo). || 2. *Geol.* Area que rodea a los continentes cubierta por las aguas de mares y océanos; equivale a un 21,7% de la superficie total del fondo oceánico. Dentro de él se reconocen tres provincias fisiográficas: plataforma continental, talud continental y glacis continental.

margen convergente. (*convergent margin*). Sinón. de **margen activo**.

margen divergente. (*divergent margin*). Sinón. de **margen pasivo**.

margen pasivo.(*passive margin*) *Geol.* Margen continental localizado en un borde de un continente sobre una placa única. Responde al modelo de margen continental de la mayoría de los bordes actuales del Atlántico.

mármol. (*marble*) 1. *Geol.* Roca metamórfica, de textura generalmente granoblástica o nematoblástica, formada por >50 % de carbonatos (calcita y/o aragonito, y/o dolomita). Cuando es impuro (5095 % de carbonatos) contiene otros minerales que pueden ser muy variados (anfíboles y clinopiroxenos cálcicos, epidota, grosularia, olivino, talco, clorita, micas, etc). Su estructura suele ser masiva o bandeada || 2. *Geol. Denom. Comer.* Roca sedimentaria o metamórfica extraída en bloque, que pueda ser cortada en tableros o losetas y ser pulida

matriz. (*matrix*) *Geol.* Material de grano fino de cualquier roca que contiene componentes (minerales o fósiles) de tamaño grande.

Mesozoico.(*Mesozoic*) *Geol.* Segundo en antigüedad de los tres eratemas en que se divide el Fanerozoico. Está comprendido entre los 251 y los 65 Ma antes de los tiempos actuales. Sinón.: **era Mesozoica**. Sinón. *ant.*: **era secundaria.**

metamorfismo. (*metamorphism*) *Geol.* Conjunto de cambios texturales y mineralógicos que experimenta una roca sometida a condiciones de presión y temperatura diferentes a las de su formación, excluyendo los procesos diagenéticos propios de rocas sedimentarias.

metamorfismo de contacto. (*contact metamorphism*) *Geol.* Metamorfismo de extensión local, de tipo térmico, que afecta a las rocas de caja de un cuerpo magmático. Está causado por el flujo de calor desde el cuerpo magmático. El rango de temperaturas que pueden alcanzarse es muy amplio, y puede ir acompañado de deformación por esfuerzos desviatorios.

metamorfismo hidrotermal. (*metasomatism*) *Geol.* Metamorfismo de extensión local, de tipo térmico, causado por la circulación de fluidos calientes ricos en H2O, generalmente acompañado de metasomatismo.
metamorfismo regional.(*regional metamorphism*) *Geol.* Tipo de metamorfismo caracterizado por ocurrir en un área de gran amplitud (p. ej. que afecta a un gran volumen de rocas), y que está asociado a procesos geotectónicos de gran escala tales como expansión de fondo oceánico, zonas de subducción, engrosamiento cortical relacionado con colisión de placas, subsidencia de cuencas, etc.
metasomatismo.(*metasomatism*) *Geol.* Proceso metamórfico por el que se produce un cambio importante en la composición química de la roca sujeta a metamorfismo por interacción con fluidos hidrotermales o magmas
meteorización. (*weathering*) 1. *Geol.* Conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos de alteración y descomposición de una roca superficial. || 2. *Geol.* Cambio en el estado de un suelo por influencia del medio ambiente o por contaminantes químicos en la lluvia o en la atmósfera. Sinón.: **intemperización.**
mica.(*mica*) *Geol.* Cada uno de los minerales que integran un grupo, de la clase de los silicatos y subclase de los filosilicatos, que cristalizan en el sistema monoclínico originando cristales tabulares o de hábito foliar, con frecuencia de contorno hexagonal. Estructuralmente están formados por capas t-o-t (tetraédrica-octaédrica-tetraédrica) que tienen una carga residual que se compensa con cationes que actuan de nexo electrostático entre capas sucesivas. Los principales minerales de este grupo son la moscovita o mica blanca, la biotita o mica negra, la glauconita, la flogopita, la margarita y la lepidolita.
mineral.(*mineral*) *Geol.* Sólido estructuralmente homogéneo y de composición química definida, originado por procesos naturales, generalmente inorgánicos. Es el componente fundamental de las rocas, pero puede aparecer aisladamente. Suele tener estructura cristalina, presentándose cristalizado o amorfo, y su origen puede ser ígneo, sedimentario o metamórfico.
mineralización. (*mineralization*) 1. *Geol.* Proceso de sustitución o adición de componentes minerales. || 2. *Geol.* Conjunto de minerales susceptibles de ser o no explotados. || 3. *Paleont.* Alteración tafonómica de restos organógenos, por sustitución o adición de componentes minerales. || 4. *Ecol.* Proceso de transformación de restos orgánicos en sustancias minerales sencillas y solubles, llevado a cabo por microorganismos del suelo.
monoclínico, ca. (*monoclinic*) *Geol.* V. **sistema monoclínico**.
moscovita. (*muscovite*) *Geol.* Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los filosilicatos y grupo de las micas, de fórmula KAl2(Si3Al)3O10(OH,F)2, que cristaliza en el sistema monoclínico, generalmente en agregados laminares o en cristales tabulares de contorno hexagonal, con exfoliación perfecta en láminas. Tiene una dureza de 2.5 a 3 y un peso específico de 2.8. Presenta color blanco plateado o amarillo, raya blanca y brillo de nacarado a vítreo, y es de translúcido a transparente. Es característico de las rocas plutónicas y filonianas ácidas, como el granito y la pegmatita, y de las rocas procedentes del metamorfismo regional, como los esquistos micáceos. Tradicionalmente se ha utilizado como aislante térmico y eléctrico. En la

actualidad tiene aplicaciones como lubricante seco y en la fabricación de barnices cerámicos. Sinón.: **mica blanca**. V. **mica.**

N

núcleo. (*core*) *Geol.* Parte interior de la Tierra, por debajo de la discontinuidad de Güttenberg, situada a una profundidad de 2 900 km. Su composición es fundamentalmente metálica (hierro y níquel) y consta de dos capas, la exterior líquida y la interior sólida. Var. **núcleo terrestre**. || 2. (*core*) *Geol.* Parte de un pliegue situada en la zona donde convergen los radios de curvatura de las superficies plegadas.
núcleo externo.(*outer core*) *Geol.* Parte exterior del núcleo terrestre, comprendida entre la discontinuidad de Güttenberg localizada a unos 2 900 km de profundidad y los 5 100 km de profundidad. Está fundido por lo que no deja pasar las ondas sísmicas transversales S.
núcleo interno. (*inner core*) *Geol.* Parte sólida del núcleo terrestre, comprendida entre los 5 100 km de profundidad y el centro de la Tierra.

O

Olivino. (*olivine*) *Geol.* Cada uno de los minerales integrados en la clase de los silicatos y subclase de los nesosilicatos que comprende dos series principales, la serie forsterita-fayalita (Mg2SiO4Fe2SiO4), más común, y la serie de los olivinos con calcio (CaMgSiO4-CaFeSiO4). Dentro de cada serie la sustitución de hierro (en forma de ión ferroso) y de manganeso permite la existencia de soluciones sólidas completas. Cristalizan en el sistema rómbico y los de la serie forsteritafayalita presentan coloraciones verde oliva o amarillenta. Se encuentran en rocas magmáticas máficas o ultramáficas. Las variedades muy puras se emplean en joyería. V. **forsterita** y **fayalita**.
onda sísmica. (*seismic wave*) *Geol.* Onda que se propaga por el interior de la Tierra y que puede tener un origen ligado a perturbación natural (tectónica, volcánica) o artificial (explosiones).
Ordovícico.(*Ordovician*) *Geol.* Segundo en antigüedad de los seis períodos en que se divide el Paleozoico. Abarca aproximadamente entre los 488.3 y los 443.7 Ma antes de los tiempos actuales. Var.: **Ordoviciano**.
orogénesis. (*orogeny, orogenesis*) *Geol.* Conjunto de procesos geológicos que dan lugar a la generación de un cinturón orogénico. Sinón.: **orogenia**.
ortoclasa. (orthoclase) Geol. Mineral de la clase de los silicatos, subclase de los tectosilicatos y grupo de los feldespatos, de fórmula KAlSi3O8, que cristaliza en el sistema monoclínico, en cristales prismáticos o tabulares, generalmente maclados (maclas de Karlsbad, de Baveno y de Manebach). Estructuralmente se caracteriza por un grado de orden Al/Si intermedio en comparación con la sanidina (elevado desorden) y la microclina (altamente ordenada). Tiene una dureza de 6 (es el término

sexto de la escala de Mohs) y un peso específico de 2.55. Presenta color blanco, gris o rosado, raya blanca o incolora y brillo vítreo, y es de transparente a opaco. Es un componente esencial de las rocas plutónicas, en especial de los granitos y filonianas ácidas Se emplea como aislante eléctrico en líneas de alta tensión y para la fabricación de esmaltes en cerámica. Sinón.: ortosa. V. feldespato, sanidina y microclina.

P

Paleoceno. (*Paleocene*) *Geol.* Primera en antigüedad de las tres épocas en que se divide el Paleógeno. Abarca aproximadamente entre los 65 y los 55.8 Ma antes de los tiempos actuales.
Paleógeno. (*Paleogene*) *Geol.* Primero en antigüedad de los tres períodos en que se divide el Cenozoico. Abarca aproximadamente entre los 65 y los 23 Ma antes de los tiempos actuales. Se subdivide en las épocas Paleoceno, Eoceno y Oligoceno.
Paleozoico. (*Paleozoic*) *Geol.* Primera en antigüedad de las tres eras en que se divide el Fanerozoico. Abarca aproximadamente entre los 542 y los 251 Ma antes de los tiempos actuales. Se subdivide en los períodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Sinón.: **era Paleozoica**. Sinón., *ant.*: **era primaria**.
Pangea. (Pangea) Geol. Supercontinente único que se supone existió a finales del Paleozoico, antes de que se separasen los actuales continentes durante el Mesozoico. [Del gr. pan ('todo') y del gr. Gaîa ('tierra')].
piso.(*stage*) *Geol.* Unidad cronoestratigráfica básica, subordinada a la serie. Es la de menor rango jerárquico reconocida internacionalmente.
pizarra. (*slate*) *Geol.* Roca metamórfica de grano ultrafino o muy fino (no visible a simple vista) que presenta una foliación bien desarrollada, formada a partir de lutitas bajo condiciones de grado metamórfico muy bajo.
placa. (*plate*) *Geol.* Cada una de las láminas rígidas en los que se divide la litosfera y que en superficie se presentan como fragmentos de casquetes esféricos de contorno muy irregular. Su movimiento está regido por la dinámica que establece la tectónica de placas. Sinón.: **placa litosférica**.
plagioclasa. (*plagioclase*) *Geol.* Serie de minerales del grupo de los feldespatos (subclase tectosilicatos, clase silicatos) con composiciones comprendidas entre la albita (NaAlSi3O8) y la anortita (CaAl2Si2O8) puras. A altas temperaturas existe una solución sólida completa entre estos dos extremos. A bajas temperaturas existen discontinuidades en la solución sólida que dan lugar a intercrecimientos de gran complejidad que únicamente se detectan mediante estudios detallados de microscopía electrónica o de difracción de rayos X. Existe una nomenclatura para la serie (albita, oligoclasa, andesina, labradorita, bytownita, anortita) que se basa en seis divisiones arbitrarias ya que las propiedades físicas varían de forma contínua con la composición. Dentro de la serie existen formas de alta y de baja temperatura. Son minerales ampliamente distribuidos, tanto en rocas ígneas como en metamórficas. Se

reconocen fácilmente por presentar casi siempre maclas polisintéticas, visibles en el microscopio petrográfico con luz polarizada.
plegamiento. (*folding*) *Geol.* Fenómeno geológico que puede producirse a cualquier escala geológica y cuyo efecto es la formación de pliegues en los materiales a los que afecta. En la mayor parte de los casos, es consecuencia de compresión e implica un acortamiento.
Pleistoceno. (*Pleistocene*) *Geol.* Epoca más antigua de las dos que componen el Cuaternario. Se desarrolló entre 2.59 Ma y 11 600 años. Comenzó con la formación del casquete glaciar en el hemisferio norte y es el intervalo de tiempo caracterizado por la alternancia de períodos glaciares e interglaciares, que siguen una ciclicidad orbital variable.
pliegue.(*fold*) *Geol.* Estructura de una roca o conjunto pétreo cuando una superficie de referencia, definida como plana antes de la deformación, se transforma en una superficie curvada o doblada. Salvo casos especiales, implica un acortamiento del espacio ocupado originalmente.
Plioceno. (*Pliocene*) *Geol.* Segunda en antigüedad de las dos épocas en que se divide el Neógeno. Abarca aproximadamente entre los 5.3 y los 2.59 Ma antes de los tiempos actuales. Durante su transcurso existieron ya las formas modernas de mamíferos y aparecieron los australopitecos, precursores primitivos del hombre.
pluma del manto. (*mantle plume*) *Geol.* Sinón. de **penacho del manto**.
plutón. (*pluton*) *Geol.* Masa extensa de roca ígnea consolidada en el interior de la corteza terrestre.
poliedro cristalino.(*crystal polyhedron*) *Geol.* Figura geométrica formada por la materia cristalina limitada por caras planas.
pórfido. (*porphyry*) *Geol.* Roca volcánica o filoniana de textura porfídica, que contiene fenocristales de cuarzo o feldespatos, incluidos en una matriz vítrea o microcristalina.
potencia. (*thickness*) *Geol.* Distancia existente en un punto dado, entre las superficies que limitan un filón, dique, estrato o conjunto de capas, medida perpendicularmente a la mayor de sus dimensiones. Sinón.: **espesor**.
principio de la horizontalidad original. (*principle of original horizontality*) *Geol.* Principio según el cual las capas de sedimento se depositan en general en una posición horizontal o casi horizontal.
principio de la sucesión faunistica. (*principle of faunal succession*) *Geol.* Principio según el cual los organismos fósiles se sucedieron unos a otros de una manera definida y determinable, y cualquier periodo de tiempo puede reconocerse por su contenido fósil.
principio de la superposición.(*superposition principle*) *Geol.* Principio según el cual, en cualquier secuencia no deformada de rocas sedimentarias, cada estrato es más antiguo que el inmediatamente superior y más moderno que el inmediatamente inferior.
principio del uniformitarismo. (*principle of uniformitarianism*) *Geol.* Principio según el cual los procesos geológicos que actuaron en tiempos pasados son los mismos que lo hacen en la actualidad.

prisma. (*prism*) **1.** *Geol.* Sistema óptico compuesto por un medio transparente limitado por caras planas en número igual o superior a dos, de tal modo que al menos dos de ellas no sean paralelas. Var.: **prisma óptico**. || 2. *Geol.* Forma abierta constituida por tres o mas caras equivalentes por simetría y paralelas a un eje común, denominado eje de zona, en morfología cristalina. || **3.** *Geol.* Cristal en forma de prisma (acep.1), en hábito cristalino. || **4.** *Geol.* Poliedro de coordinación con forma de prisma (acep.1.), en una estructura cristalina.
prisma de acreción. (*accretion prism*) *Geol.* Acumulación de sedimentos en forma de cuña en la placa superior de una zona de subducción, formada por sedimentos oceánicos pelágicos, sedimentos turbidíticos y lavas basálticas, afectados por cabalgamientos. Sinón.: **complejo de subducción**.
proceso endógeno. (*endogenetic process*) *Geol.* Proceso geológico que actua en el interior de la Tierra y que contribuye al ciclo geológico interno.
proceso exógeno. (*exogenous process*) *Geol.* Proceso geológico que actua sobre la superficie de la Tierra y que contribuye al ciclo geológico externo.

R

radiactividad terrestre. (*terrestrial radioactivity*) *Geol.* Radiactividad que se desarrolla en el interior de la Tierra por la desintegración de isótopos contenidos en los minerales y que genera el calor interno que, junto con el procedente de otras fuentes, controla el gradiente geotérmico.
radiocronología. (*radiometric dating*) *Geol.* Parte de la geocronología basada en la desintegración de elementos radioactivos naturales (^{14}C, ^{40}K, ^{40}Ar, ^{87}Rb, ^{87}Sr, ^{232}Th, ^{235}U, ^{238}U) que permite medir la edad de las rocas, expresada en años.
raya. (*scratch, streak*) *Geol.* Incisión que se practica en la superficie de un mineral con un objeto de mayor dureza que él. El color de la raya es un carácter diagnóstico en la identificación de visu del mineral.
recristalización. (*recrystallization*) **1.** *Geol.* Proceso metamórfico mediante el cual se produce la cristalización de nuevos granos a expensas de granos de la misma especie mineral. Se origina a temperaturas elevadas y puede producirse en ausencia de esfuerzo (recristalización estática) o en presencia del mismo (recristalización dinámica). || **2.** *Paleont.* Alteración tafonómica de los restos organógenos por cambio de la forma, el tamaño o la orientación de sus componentes minerales, como suele acontecer con las placas esqueléticas de los equinodermos.
recurso mineral. (*mineral resource*) *Geol.* Parte de la corteza terrestre con rocas o sustancias minerales que pueden ser explotadas con beneficio económico.
red cristalina. (*crystal lattice*) *Quím., Geol.* Red tridimensional en la que los nudos (ocupados por átomos) se distribuyen periódicamente en tres direcciones del espacio no situadas en el mismo plano. Se caracteriza por los ángulos que forman entre sí estas tres direcciones y por los períodos de traslación sobre cada una de ellas. Sinóns.: **estructura reticular**, **retículo espacial.**

relieve morfoestructural. (*morphostructural relief*) *Geol.* Formas de relieve estrechamente ligadas a las estructuras tectónicas.
rift. (*rift*) *Geol.* Fosa tectónica de gran longitud limitada por fallas y generada por un adelgazamiento litosférico debido a la acción de esfuerzos distensivos horizontales. Puede ser continental u oceánico y presenta una gran actividad volcánica y sismica; además, los rifts continentales son cuencas receptoras de sedimentos. Es la expresión geológica de los límites de placa divergentes.
riolita. (*rhyolite*) *Geol.* Roca volcánica, subalcalina o alcalina, ácida, rica en vidrio y con cristales de cuarzo, feldespato alcalino y biotita y con textura fluidal. Además con frecuencia tiene plagioclasa y anfíbol. Sinón. **liparita**.
roca. (*rock*) *Geol.* Material sólido que se origina en el interior o en la superficie de la corteza terrestre, como consecuencia de los procesos endógenos o exógenos. En la mayor parte de los casos, está formado por una asociación de minerales de la misma o de distintas especies; excepcionalmente, algunas rocas volcánicas pueden estar formadas por minerales y vidrio o solamente por vidrio.
roca de caja. (*host rock*) *Geol.* Roca que contiene o alberga una mineralización.
roca detrítica.(*detrital rock*) *Geol.* Roca formada por acumulación de fragmentos de otras rocas y minerales preexistentes, debidamente compactados.
roca efusiva.(*effusive rock*) *Geol.* Roca resultante del enfriamiento de una lava volcánica, que tiene textura vítrea, vitro-porfídica o vacuolar. Sinón.: **roca extrusiva, roca volcánica**.
roca ígnea. (*igneous rock*) *Geol.* Roca resultante del enfriamiento y consolidación de un magma. Pueden ser volcánicas o plutónicas, según que se consoliden en la superficie o en el interior de la corteza terrestre. Sinón.: **roca magmática**.
roca madre.(*oil-source rock*) *Geol.* Roca de origen sedimentario que se convierte en generadora de hidrocarburos, debido a sus características texturales (grano fino), a su ambiente de formación (medio reductor y condiciones muy precisas de salinidad y batimetría), a su alto contenido en materia orgánica y a haber sufrido una evolución favorable.
roca metamórfica. (*metamorphic rock*) *Geol.* Roca formada por recristalización de un protolito, ya se de una roca sedimentaria, ígnea, o metamórfica preexistente, bajo condiciones físico-químicas (generalmente presión y temperatura) distintas a las de la formación originaria. Genralmente, presenta diferencias drásticas en mineralogía, textura, estructura y, a veces, en composición química, respecto al protolito.
roca piroclástica. (*pyroclastic rock*) *Geol.* Roca formada por los productos fragmentarios arrojados en erupciones volcánicas. V. **piroclasto**.
roca sedimentaria. (*sedimentary rock*) *Geol.* Roca formada en el exterior de la corteza terrestre mediante un proceso de sedimentación. Presenta estructuras características, como, principalmente, la estratificación.

S

sedimentación. (*sedimentation*) *Geol.* Proceso de formación o acumulación de sedimentos. V. **tasa de sedimentación**.
sedimentario, ria. (*sedimentary*) *Geol.* [ciclo, cuenca, estructura, proceso, roca, secuencia] Relacionado con o formado por la sedimentación. V. **ciclo sedimentario**, **cuenca sedimentaria**, **medio sedimentario** y **roca sedimentaria**.
sedimento.(*sediment*) *Geol.* Producto natural, en forma de roca no consolidada, que resulta de la precipitación química o de la acumulación, bien sea mediante arrastre o gravitativa, de partículas procedentes de la descomposición de otras rocas, independientemente de cuál sea el tamaño de aquellas. El medio de sedimentación puede ser continental, costero o marino. Sinón.: **depósito**.
sedimento detrítico. (*detrital sediment*) *Geol.* Sedimento formado esencialmente por detritos.
silicato.(*silicate*) *Geol.* Integrante de una clase muy numerosa de minerales constituidos por silicio, oxígeno, hidrógeno y elementos metálicos, entre los que predominan el aluminio, el magnesio, el hierro, el calcio y el sodio. Se caracteriza por la existencia de átomos de silicio coordinados tetraédricamente a átomos de oxígeno. Los átomos metálicos se sitúan en el centro de los poliedros formados por los átomos de oxígeno. La gran variedad que se conoce se debe a que los tetraedros de silicio pueden estar aislados o formando agrupaciones discretas, o polímeros de extensión indefinida, por unión de vértices de los tetraedros, al compartir átomos de oxígeno y, en este caso, por la diversidad de maneras de compartirlos. Estos aspectos estructurales están relacionados con las propiedades, y en ellos se basa la clasificación de los silicatos en subclases y la subdivisión de estas en grupos.
sílice. (*silica*) *Geol.* Componente, resistente a la erosión, de numerosas rocas constituido por dióxido de silicio. Se presenta aislado en diversos minerales (cuarzo, calcedonia, cristobalita, tridimita, ópalo, jaspe) y combinado formando parte de los silicatos.
silicificación. (*silication*) *Geol.* Reemplazamiento de los minerales de una roca por cuarzo.
sinclinal. (*syncline*) *Geol.* Pliegue cuyo núcleo está constituido por las rocas estratigráficamente más modernas. En general, es sinforme, aunque a veces puede ser antiforme.
sismicidad. (*seismicity, seismic activity*) *Geol.* Grado de actividad sísmica en una zona que se manifiesta por el registro del número de terremotos, su frecuencia y las magnitudes e intensidades sentidas.
sistema acuífero. (*aquifer system*) *Geol.* Conjunto de acuíferos, acuitardos y acuicludos que tienen entre sí cierta conexión hidráulica, y unas condiciones en los límites con las formaciones circundantes que permiten considerar ese conjunto como una entidad característica.

sistema de cabalgamientos. (*thrust system*) *Geol.* Conjunto de cabalgamientos relacionados genéticamente. Entre ellos se distinguen las estructuras imbricadas y los dúplex.
sistema cristalino. (*crystal system*) *Geol.* Cada uno de los siete conjuntos en que se clasifican los 32 grupos puntuales de simetría.
sistema cúbico.(*cubic system*) *Geol.* Sistema cristalino caracterizado por disponer de cuatro ejes de simetría ternarios, en consecuencia los tres parámetros de celda son iguales y los tres ángulos de 90º. Sinón.: **sistema regular**.
sistema deposicional.(*depositional system*) *Geol.* Cuerpo tridimensional de litofacies relacionadas genéticamente por procesos y ambientes activos (modernos) o deducidos (antiguos).
sistema de diaclasas.(*joint system*) *Geol.* Asociación formada por dos o más conjuntos de diaclasas sistemáticas que se intersentan.
sistema electromagnético. (*electromagnetic system*) *Geol.* Sistema de prospección geofísica que estudia los campos secundarios eléctricos o magnéticos, provocados artificialmente en el subsuelo. Determina las resistividades eléctricas del mismo.
sistema estratigráfico.(*stratigraphic system*) *Geol.* División estratigráfica que se corresponde con la división cronológica de período. Los sistemas se subdividen en series y en pisos.
sistema de fallas normales. (*normal fault system*) *Geol.* Conjunto de fallas normales relacionadas genéticamente.
sistema hexagonal. (*hexagonal system*) *Geol.* Sistema cristalino caracterizado por disponer de un eje de orden 6; en consecuencia dos de sus parámetros de celda son iguales formando sus vectores un ángulo de 120º, mientras que el tercer vector que define la celda es perpendicular al plano definido por los otros dos.
sistema imbricado. (*imbricate system*) *Geol.* Sinón.: de **abanico imbricado**.
sistema monoclínico. (*monoclinic system*) *Geol.* Sistema cristalino caracterizado por tener elementos de simetría de orden dos paralelos a una dirección del espacio si son ejes o perpendiculares a esta dirección si son planos. En consecuencia sólo hay dos ángulos de los parámetros de celda que son iguales a 90º.
sistema montañoso. (*mountain system*) Sinón. de **cordillera**.
sistema rómbico. (*orthorhombic system*) *Geol.* Sistema cristalino caracterizado por tener elementos de simetría de orden dos en tres direcciones perpendiculares entre si; en consecuencia los tres ángulos de los parámetros de celda son de 90º.
sistema tetragonal. (*tetragonal system*) *Geol.* Sistema cristalino caracterizado por tener un eje de orden cuatro; en consecuencia dos longitudes de los parámetros de celda son iguales y los tres ángulos son de 90º.
sistema triclínico. (*triclinic system*) *Geol.* Sistema cristalino formado por aquellos cristales que tienen como operaciones de simetría la identidad y además pueden tener un centro de inversión; en consecuencia, sus parámetros de celda no están condicionados a tener un valor concreto.
sistema trigonal. (*trigonal systhem*) *Geol.* Sistema cristalino caracterizado por tener un eje de orden 3. Este sistema sólo tiene dos tipos de celda: la celda primitiva en

cuyo caso los parámetros de celda son como aquellos del sistema hexagonal o la celda romboédrica.
skarn. (*skarn*) 1. *Geol.* Roca de metamorfismo de contacto formada por metasomatismo inducido por intrusiones magmáticas sobre rocas calizas o dolomías y que están constituidas por carbonatos, cuarzo y una gran variedad de silicatos cálcicos como wollastonita, diópsido, grosularia, epidota, etc. || 2. *Geol.* Yacimiento mineral formado por metasomatismo generalmente de calizas en la proximidad de rocas ígneas.
subsidencia. (*subsidence*) 1. *Geol.* Hundimiento progresivo del fondo de una cuenca sedimentaria, que permite la acumulación de grandes espesores de sedimentos durante un intervalo de tiempo prolongado. || 2. *Geol.* Hundimiento o asentamiento de la superficie terrestre debido a causas naturales o antropogénicas.

T

tabular. (*platy*) *Geol.* [agregado, cristal, cuerpo rocoso, yacimiento, intrusión] Que tiene forma de tabla. V. **hábito cristalino tabular**.
talud. (*talus, slope*) *Geol.* Inclinación natural del terreno o de un muro.
techo. 1. (*top, roof*) *Geol.* Superficie superior de un estrato. V. **muro**, acep. 1. || 2. (*top*) *Geol.* Roca situada encima de un yacimiento. || 3. (*hanging wall*) *Geol.* Parte de un yacimiento que está por encima de una labor minera. || 4. (*top*) *Geol.* Bloque de una falla por encima del plano de falla.
téctónica. (*tectonics*) 1. *Geol.* Sinón. de **geología estructural**. || 2. *Geol.* Estudio de los aspectos más generales de la estructura continental, oceánica o global. || 3. *Geol.* Conjunto de deformaciones de escala mayor que se expresan en las rocas y que definen a una región y permite diferenciarla de otras. V. **tectónica de plegamiento, tectónica de escapeterremoto**.(*quake, earthquake*) *Geol.* Movimiento súbito de superficie terrestre generado por la liberación brusca de energía elástica en el hipocentro y que se radia en forma de ondas sísmicas que se propagan por el interior de la Tierra. Sinón.: **sismo, seismo**.
textura.(*texture*) 1. *Geol.* Conjunto de características de los granos minerales que forman una roca, referentes al tamaño, forma, grado de angulosidad y desarrollo. || 2. *Geol.* Microestructura de un material en que los cristales componentes presentan una orientación dominante. || 3. *Geol.* Sinón. de **microestructura**.
textura afanítica. (*aphanitic texture*) *Geol.* Textura de las rocas ígneas en la que los granos minerales no se distinguen a simple vista. Antón.: **textura fanerítica**.
textura afanocristalina.(*aphanocrystaline*) *Geol.* Textura en mosaico de las rocas carbonáticas sedimentarias, en las que los cristales tienen un tamaño de entre 1 y 4 m (micrita). Sinón.: **textura micrítica**.
textura fanerítica.(*phaneritic texture*) *Geol.* Textura en la que los granos minerales se distinguen a simple vista. Incluye las texturas microcristalina y criptocristalina. Antón.: **textura afanítica**.

textura holocristalina.(*holocrystalline texture*) *Geol.* Textura de las rocas ígneas formada exclusivamente por cristales.
textura porfírica. (*porphyritic texture*) *Geol.* Textura de algunas rocas volcánicas y filonianas en las que se aprecia al microscopio una matriz microcristalina que engloba cristales de mayor tamaño (fenocristales). Var.: **textura porfídica**.
textura vítrea.(*vitreous texture*) *Geol.* Textura de algunas rocas volcánicas que han sufrido un enfriamiento rápido, dando lugar a una masa amorfa en la que no se diferencian cristales. Suele presentar las características de un vidrio: fragilidad, fractura concoidea y ausencia de exfoliación. Sinón.: **textura hialina**.
toba. (*tuff*) 1. *Geol.* Roca piroclástica consolidada. Según sea el tamaño medio de los granos se denomina *toba de lapilli* (2 a 64 mm) o *toba cinerítica* (menor de 2 mm) || 2. *Geol.* Depósito de cenizas volcánicas litificado.
travertino. (*tufa, sinter, travertine*) *Geol.* Caliza de color claro, con textura a menudo porosa o tubular, formada por precipitación de carbonato cálcico en el seno del agua, muchas veces sobre restos vegetales. Sinón.: **toba calcárea**.
turba. (*peat*) *Geol.* Producto de descomposición de materias vegetales al quedar enterradas bajo el agua y sedimentos terrígenos. Se produce así una carbonificación lenta, en la que la turba es la primera etapa de la transformación del tejido vegetal en carbón. Es de color pardo amarillento a negro, y conserva la estructura vegetal. El contenido en carbono aumenta aproximadamente del 40%, en el material vegetal original, al 60% en la turba. Tiene poder calorífico inferior a 8.4 MJ/kg. V. **carbón mineral** y **turbera**.

U

unidad estratigráfica. (*stratigraphic unit*) *Geol.* Conjunto de rocas estratificadas que se delimita de las que lo rodean en función de un atributo o carácter específico. Los principales tipos se basan en su litología (unidad litoestratigráfica), en su contenido fosilífero (unidad bioestratigráfica), en su edad (unidad cronoestratigráfica) o en su polaridad magnética (unidad magnetoestratigráfica).

V

veta. (*vein*) *Geol.* Mena o mineralización en una labor minera.
volcán. (*volcano*) *Geol.* Lugar de la superficie terrestre, o eventualmente de otro planeta o de un satélite, por donde salen al exterior, a elevada temperatura, materiales procedentes de zonas profundas del mismo. El aparato volcánico se forma por la acumulación de estos materiales, que originan una estructura generalmente de forma cónica.



xenocristal. (*xenocryst*) *Geol.* Cristal ajeno a la formación de una masa rocosa en la que se encuentra incluido, pero que existía antes de que esta se formase.
xenolito. (*xenolith*) *Geol.* Fragmento de roca incluido en una roca plutónica o volcánica o dentro de una formación diapírica.



yacimiento. (*deposit, ore*) *Geol.* Lugar donde se hallan naturalmente una roca, un mineral o un fósil.