

Truncated common span (DIA-NN XIC off-centre): 4576 of 72993 precursors (6.3%). R = random sample, S = stratified sample
OpenSWATH
ours B (OSW rules)
DIA-NN 1.7.12
ours A (DIA-NN rules)
R AGLYWGYTVR2
y6 r 1.00 log2 +0.10
MS1 rA/D 1.00 l1 0.01
R C[CAM]TQLLESLHSK3
y6 r 0.98 log2 +0.17
MS1 rA/D 0.14 l1 1.67
S AHVFQLDPNTK2
b2 r 1.00 log2 +0.07
MS1 rA/D 1.00 l1 0.00
S ASM[Ox]GMLR1
y1 r 0.94 log2 +0.16
MS1 rA/D -0.01 l1 1.91
S EAHQLFLEPEVLDPESVELK3
b8 r 1.00 log2 +0.00
MS1 rA/D 0.57 l1 0.71
S EATADDLLK2
y5 r 1.00 log2 +0.05
MS1 rA/D 0.42 l1 1.15
S HNELQHMLTR3
y4 r 0.96 log2 -0.22
MS1 rA/D 0.82 l1 0.81
S LAEENGAAFAGGTSLLQK2
y10 r 1.00 log2 +0.03
MS1 rA/D 1.00 l1 0.00
S LVEDEPNK2
y6 r 1.00 log2 -0.01
MS1 rA/D 1.00 l1 0.13
S PKPFGSEEQLLPVEK3
y4 r 1.00 log2 -0.04
MS1 rA/D 0.92 l1 0.47