

Satır Basamak Formu

Tanım: Aşağıdaki şartları sağlayan matrise, satır basamak formadır denir.

- 1) Her satırdaki (soldan sağa) sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmalıdır.
- 2) k_0 satırdaki elemanların hepsi birden sıfır değil ise, $k+1_0$ satırdaki (soldan sağa) öndeki sıfırların sayısı, k_0 satırdaki (soldan sağa) öndeki sıfırların sayısından daha büyük olmalıdır.
- 3) Elemanlarının hepsi birden sıfır olan satırlar, elemanlarının hepsi birden sıfır olmayan satırların altında olmalıdır.

ÖRNEKLER

a) $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(a), (b), (c) satır basamak formelidir.

(d), (e), (f) " " " değildir

Tanım: Bir lineer sistemde I. II. III. satır işlemlerini kullanarak, genişletilmiş matrisi satır basamak formunda olan bir sisteme, geçiş sürecine, Gauss yoketme yöntemi denir

ÖRNEKLER

1) Aşağıdaki sistemleri Gauss yoketme yöntemi ile çözümler

$$a) \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 3 \\ 2x_1 - x_2 = 9 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

$$a) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{s_2 \rightarrow s_2 + (-2)s_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{array} \right]$$

$$0 \cdot x_1 + 3x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = 1$$

$$x_1 - 2x_2 = 3 \Rightarrow x_1 = 5$$

(5, 1)

$$b) \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{s_1 \leftrightarrow s_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_2 - x_3 = -5 \quad x_3 = \alpha \in \mathbb{R} \quad x_2 = \alpha - 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \Rightarrow x_1 = 3 - x_2 - x_3 = 8 - 2\alpha$$


$$(8 - 2\alpha, \alpha - 5, \alpha) \quad \alpha = 4 \quad (0, -1, 4)$$

Aşırı Belirgin Sistemler

Bir lineer sistemde, bilinmeyenlerden daha fazla denklem sayısı varsa bu sisteme aşırı belirgin denir. Bu sistemler genelde korarsızdır (Her zaman değil) (tutarsız)

Örnek:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 \\ x_1 - x_2 &= 2 \\ -x_1 + 2x_2 &= -2 \end{aligned}$$



Az Belirgin Sistemler

Eğer bir sistemde denklem sayısı bilinmeyenlerden az ise bu sisteme az belirgin sistem denir. m lineer denklem n bilinmeyen varsa $m < n$ dir. Genelde sonsuz sayıda çözüm vardır ama korarsız da olabilir. Bu sistemlerde yalnız bir çözüm yoktur.

örnekler

$$1) \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 5 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 8 \end{aligned}$$

$$2) \begin{aligned} -x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 5 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 2 & 8 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right] \text{ gözün yok. } \alpha x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -2$$

$$(2) \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 & -1 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 5 & 10 \\ 0 & 4 & -4 & 8 & 14 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 12 & -14 & -26 \end{array} \right]$$

$$12x_3 - 12x_4 = -26 \quad x_4 = \alpha \in \mathbb{R} \quad x_3 = \alpha - \frac{13}{6}$$

$$x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 10 \Rightarrow x_2 = \frac{4}{3} - \alpha$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 3 \Rightarrow x_1 = \alpha + \frac{1}{2} \quad \left(\alpha + \frac{1}{2}, \frac{4}{3} - \alpha, \alpha - \frac{13}{6}, \alpha \right)$$

İndirgenmiş Satır Bosamak Formu

Tanım: Aşağıdaki şartları sağlayan matrise, indirgenmiş satır bosamak formdadır denir.

- 1) Matris satır bosamak formdadır.
- 2) Her satırdaki (soldan sağa) sıfırdan farklı ilk elemanın bulunduğu sütunda bu elemanın dışındaki bütün elemanlar sıfır olmalıdır.

Tanım: Bir lineer sistemde I. D. ve II. satır işlemleri kullanarak genişletilmiş katsayılar matrisi indirgenmiş bosamak formu olan bir sisteme, geçiş sürecine, Gauss-Jordan indirgeme yöntemi denir.

örnekler. 1) a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) (c) indirgenmiş basamak formunda
(d) (e) // // // doğrudur

2) Gauss-Jordan indirgeme yöntemini kullanarak aşağıdaki sis. çözünüz.

a) $x_1 + x_2 = -1$
 $4x_1 - 3x_2 = 3$

b) $x_1 + x_2 + x_3 = 0$
 $x_1 - x_2 - x_3 = 0$

a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -7 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$
 $\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ $x_1 = 0$
 $x_2 = -1$ $\downarrow s_2 \rightarrow \frac{s_2}{-7}$

Tanım: Bir lineer denklem sisteminde sağ tarafındaki sabitlerin tümü sıfır ise bu sisteme homojen sistem denir.

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

Teorem: Bir $m \times n$ homojen denklem sisteminde, $n \geq m$ ise sistem asiter olmayan çözüme sahiptir.

MATRİS CEBRİ

Matrisler genellikle A, B, C, \dots gibi büyük harflerle gösterilir. Bir satıra veya bir sütuna sahip matrisler, bir lineer sistemin çözümüne temsil ettiği için özellikle ilginçtir. n -bilinmeyenli bir lineer sistemin çözümü $(a_1, a_2, \dots, a_n) = ([a_1, a_2, \dots, a_n])$ bir vektördür. Bu vektör $1 \times n$ tipinde bir matris olarak gösterilirse satır vektör, $n \times 1$ tipinde bir matris olarak gösterilirse sütun vektör denir.

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] \quad \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

Örneğin

$$x_1 + 3x_2 = 7$$

$$3x_1 - x_2 = 1$$

lineer sisteminin çözümü satır vektör olarak $[1 \ 2] \ (1, 2)$, sütun vektör olarak $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ile gösterilir.

Bütün $n \times 1$ matrislerin kümesine öklidyen n -uzay denir ve \mathbb{R}^n ile gösterilir.

$$x \in \mathbb{R}^n \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Eğer A , $m \times n$ tipinde bir matris ise i . satır
 $a(i,:) = [a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}]$ $i=1,2,\dots,m$
 j . sütun

$$a(:,j) = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad j=1,2,\dots,n$$

ile gösterilir (Bir matris) $A = (a_{ij})$ ile kısaca ifade edilir

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

2. satır $[3 \ -1 \ 4]$

3. sütun $\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

$$a_{12} = 2$$

$$a_{33} = 5$$

Tanım: Her i ve j için $a_{ij} = b_{ij}$ ise $m \times n$ tipindeki A ve B matrisine esitlik denir.

Tanım: A , $m \times n$ tipinde bir matris ve α bir skaler ise, αA , (i,j) 'nin elemanı αa_{ij} olan $m \times n$ tipinde bir matristir.

Tanım: $A = (a_{ij})$ ve $B = (b_{ij})$ $m \times n$ tipinde matrisler ise $A+B$, (i,j) 'nin elemanı $a_{ij} + b_{ij}$ olan $m \times n$ tipinde bir matristir.

Örnekler

$$1) A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & x \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \quad A=B \text{ için}$$

x ne olmalıdır.

$$a_{11}=3 \quad a_{12}=5 \\ a_{21}=8 \quad a_{22}=4$$

$$b_{11}=3 \quad b_{12}=x \\ b_{21}=8 \quad b_{22}=4$$

$$a_{ij} = b_{ij}$$

$$a_{11} = b_{11} \Rightarrow$$

$$a_{12} = b_{12} \Rightarrow x = 5$$

$$2) A = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ -1 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{ise} \quad d = -4 \text{ ile}$$

$$-4A = ?$$

$$-4A = \begin{bmatrix} -16 & -32 \\ 4 & -36 \end{bmatrix}$$

$$3) A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{ise } A+B = ?$$

$$A+B = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 8 \\ 3 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha r_i = \alpha r_1 + \alpha r_2 + \alpha r_3 + \dots + \alpha r_n \\ = \sum_{j=1}^n \alpha r_j = \sum_{k=1}^n \alpha r_k = \sum_{l=1}^n \alpha r_l$$

Tanım: $A = (a_{ij})$, $m \times n$ tipinde, $B = (b_{ij})$, $n \times r$ tipinde bir matris ise A ve B matrislerinin çarpımı, $AB = C = (c_{ij})$, (i, j) 'ninci elemanı

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

olan $m \times r$ tipinde bir matristir.

Örnek: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$

2×2 2×3

$$c_{11} = \sum_{k=1}^2 a_{1k} b_{k1} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21}$$

$$c_{23} = \sum_{k=1}^2 a_{2k} b_{k3} = a_{21} b_{13} + a_{22} b_{23}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} & a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} & a_{11} b_{13} + a_{12} b_{23} \\ a_{21} b_{11} + a_{22} b_{21} & a_{21} b_{12} + a_{22} b_{22} & a_{21} b_{13} + a_{22} b_{23} \end{bmatrix}$$

2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

3×2 2×3

$$AB = \begin{bmatrix} 1.1+3.1 & 1.2+3.3 & 1.4+3.1 \\ 4.1+2.1 & 4.2+2.3 & 4.4+2.1 \\ 5.1+1.1 & 5.2+1.3 & 5.4+1.1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 11 & 7 \\ 6 & 14 & 18 \\ 6 & 13 & 21 \end{bmatrix}$$

$$3) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$AB = ? \quad 2 \times 2 \quad \underline{\underline{3 \times 2}} \quad \begin{matrix} AB \text{ olmaz} \\ BA \text{ olabilir} \end{matrix}$$