

**ISTRUZIONE: ACIDBLOCK cpr 03011962/1**  
F.to 130x160 mm steso - f.to 130x40 mm piegato

Stampa a 1 colore fronte retro - nero



Pharmatru

**Çiğneme Tableti**

Reflü, aşırı mide asidinin düzenlenmesi ve mide mukozasının korunmasında etkilidir.

**1. Tıbbi cihazın tanımlanması, bileşimi ve amacı:**

**1.1 Etki mekanizması:** Demirhindi tohumlarının mukoadhezif özellikleri, farinksten mideye kadar gastrointestinal sistemin mukozası üzerinde koruyucu etkileri teşvik etmek için faydalıdır; ürün mukozaya yapışarak bir bariyer görevi görür ve gastroözofageal ve laringofaringeal reflü semptomlarına karşı rahatlama sağlar. Aljinat, bazı alglardan izole edilen bir polisakkartitdir. Mideye ulaşlığında hızla viskoz ve hafif bir jel oluşturarak mide mukozasını kaplar ve korur. Ayrıca, aljinatin viskoz jel mide içeriğinin yukarı doğru hareketini engelleyerek reflü ataklarının oluşumunu önemli ölçüde azaltır. Karbonat ve bikarbonat kombinasyonu mide asidini etkili bir şekilde nötralize eder. Dahası, reaksiyonda oluşan karbondioksit kabarcıkları aljinat jel tarafından hapsedilir ve mide sularının yüzeyinin üzerinde yüzen bir köpüğe dönüşür. Reflü atakları sırasında özofagus'a giren köpük esas olarak asitlerin ve sindirim enzimlerinin hasarına karşı mukozaya fiziksel koruma sağlayan aljinattan oluşur. Bu köpük, gastrik sindirim tamamlaması ve bolusun bağırsağa geçmesi için yeterli bir süre midede kalır. Ayrıca, demirhindi tohumlarının mukoadhezif özellikleri gastroprotektif etkileri teşvik etmek için faydalıdır.

**1.2 Bileşenler:** Her bir tablet; Sodyum aljinat, Kalsiyum karbonat, Potasyum bikarbonat ve Demirhindi tohum ekstresi içermektedir.

**Yardımcı maddeler:** Mannitol, mikrokristalin selüloz, maltodekstrin, magnezyum stearat, nane aroması, silikon dioksit, sukkaroz.

**2. Ambalaj:** Bir kutu 24 çiğneme tableti içerir.

**3. Dozaj ve kullanım yöntemi:** Yetişkinler ve gençler (12-18 yaş): Önerilen pozoloji, semptomlar düzelenle kadar en az iki hafta boyunca, iki ana öğünden sonra 2 tablet ve yatmadan önce 2 tablet olmak üzere günde 6 tablettr. Ürünü aldıktan bir ay sonra durum devam ederse, bir doktora danışılması tavsiye edilir. **Eğer hiperasidite semptomları düzelmeden devam ederse, dozun iki katına çıkarılması düşünülebilir.** Çocuklar için (6-12 yaş): dozu yarıya indiriniz.

**4. Yan etkiler:** Bireysel intolerans örnekleri dışında, ara sıra görülen hafif ve geçici bulantı veya kabızlık dışında, terapötik etki için gerekli dozarda herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Semptomlar devam ederse, doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Pharmatru

**5. Besin takviyeleri ve ilaçlarla etkileşimler:** Tibbi cihaz, viskoz yapısı nedeniyle, eş zamanlı olarak uygulanan ilaçların emilimini potansiyel olarak geciktirebilir veya azaltabilir. Bu nedenle, özellikle doğum kontrol hapları veya hayatı öneme sahip ilaçlar kullanıyorsanız, Acidblock® gibi bir ürünü kullanmaya başlamadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir. Ürün omeprazol, simetidin veya sisaprid gibi farmakolojik ürünlerle birlikte kontrendikasyon olmasızın kullanılabilir; ancak bu gibi durumlarda doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

**6. Saklama:** Acidblock®'u kuru bir yerde ve doğrudan ışık veya ışık kaynaklarından uzakta saklayınız; kabarcığı sadece kullanım sırasında açınız. Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Cihazı 25°C'in altında tutunuz.

**7. Uyarılar ve önlemler** 6-18 yaş arası çocuklarda ve gençlerde, ürünü yalnızca kesinlikle gerekliese ve tıbbi gözetim altında kullanınız. Ürünü 6 yaşından küçükler kullanmamalıdır. Bilinen herhangi bir risk olmamasına rağmen, hamile veya emziren bireyler ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka tıbbi tavsiye almalıdır. Hamilelik veya emzirme döneminde, bilinen herhangi bir risk olmamasına rağmen, ürünün tıbbi tavsiye altında alınması önerilmektedir. Daha yüksek miktarlar kabızlık veya geçici ishalin başlamasına neden olabileceğiinden önerilen dozu aşmayın. Ürün, kronik kabızlık veya ishal, böbrek hastalığı veya kronik kalp yetmezliği durumlarında kontrendikedir. Bir süre kullanıldıktan sonra ürün semptomları açıkça azaltmadıysa, bir doktora danışılması önerilir. Acidblock®'u arkaya arkaya 30 günden fazla kullanmayın. Belirtiler devam ederse bir doktora danışın. Ürüne karşı toleransınız yoksa veya bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılığınıza varsa almayın.

**8. Son kullanma tarihi:** Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi, uygun şekilde saklandığında hasar görmemiş ambalajındaki ürünü ifade eder.

**9. İmha:** Son kullanma tarihi geçmiş cihazlar Yerel İdare Yöneticisi tarafından belirlenen atık yönetimi yönetmeliklerine uygun olarak ele alınmalıdır. Ürün veya ambalajı hiçbir koşulda çevreye atılmamalıdır.

**İlk yayılanma tarihi: 04/2024**

**Son revizyon: 04/2024**



Distribütör: Pharmatru Sağlık Malzemeleri  
Anonim Şirketi Yassıören Mah. Ağakakak Sk.  
No: 15A Arnavutköy / İstanbul / Türkiye  
444 8 717 info@pharmatru.com.tr



03011962/1