居宅療養管理指導　報告書

にしくまもと病院

佐藤　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾖｼ	1943年8月10日　〔 82 歳〕	男性	TEL：
池田　勝義様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」　１Ｔ
└[般]アゼルニジピン錠16mg
フルイトラン錠１ｍｇ　２Ｔ
└[般]トリクロルメチアジド錠1mg
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
(包)分１　朝食後　14日

エンレスト錠２００ｍｇ　１Ｔ
ジルテック錠１０　１０ｍｇ　１Ｔ
└[般]セチリジン塩酸塩錠10mg
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」　１Ｔ
└[般]ニフェジピン徐放錠10mg（２４時間持続）
(包)分１　夕食後　14日

リオレサール錠５ｍｇ　２Ｔ
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　２Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠330mg
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」　２Ｃ
└[般]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
(包)分２　朝夕食後　14日

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」　３Ｔ
└[般]モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg
(包)１日３回食後服用　14日

デエビゴ錠５ｍｇ　２Ｔ
ベンザリン錠５　５ｍｇ　１Ｔ
└[般]ニトラゼパム錠5mg
センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」　２Ｔ
└[般]センノシド錠12mg
(包)分１　就寝前　14日

グーフィス錠５ｍｇ　１Ｔ
(包)分１　夕食前　14日

モビコール配合内用剤ＨＤ　１３．７０４６ｇ　1包
(包)分１　朝食後　14日

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）　５ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「イワキ」　20mL
└[般]ピコスルファートナトリウム水和物経口液0.75%
(包)便秘時

ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＹＤ」　１Ｔ
(包)分１　起床時　1日

訪問日	2026年1月14日
調剤形態	一包化（別包有）
服薬管理者	施設
管理方法	配薬BOX
服薬　服薬状況	良

指導内容

内服変更なし、経過観察。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。
コンプライアンス向上目的でモビコールLD2包→HD1包へ変更

■ハイリスク薬指導
【抗てんかん剤】ベンザリン錠５　５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。

■服薬指導
・アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」：血圧を下げる薬です。めまいやふらつきに注意し、転倒を防ぐよう説明しています。
・フルイトラン錠１ｍｇ：尿量を増やし血圧を下げる薬です。検査時には服用中であることを医師に伝えるよう説明しています。
・エンレスト錠２００ｍｇ：心臓の働きを助け、血圧を下げる薬です。定期的な受診と検査を受けるよう説明しています。
・ジルテック錠１０　１０ｍｇ：アレルギー症状やかゆみを改善する薬です。アルコール摂取を控えるよう説明しています。
・ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」：血圧を下げ、狭心症を改善する薬です。めまいやふらつきに注意するよう説明しています。
・リオレサール錠５ｍｇ：筋肉の緊張を緩める薬です。筋力低下やだるさに気づいたら医師に連絡するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。異常があれば服用を中止し受診するよう説明しています。
・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」：血流を良くしコレステロールを減らす薬です。過敏症状が出たら医師に連絡するよう説明しています。
・モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」：消化管の働きを助ける薬です。自己判断で長期使用しないよう説明しています。
・デエビゴ錠５ｍｇ：入眠を促す薬です。服用後の眠気や注意力低下に注意し、飲酒を避けるよう説明しています。
・ベンザリン錠５　５ｍｇ：不安を和らげ、入眠を促す薬です。適正使用を守り、依存に注意するよう説明しています。
・センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」：便通を良くする薬です。飲み忘れた場合は次回分を守り、２回分を一度に服用しないよう説明しています。
・グーフィス錠５ｍｇ：便通を良くする薬です。飲み忘れた場合は次の食前に服用し、２回分を一度に服用しないよう説明しています。
・モビコール配合内用剤ＨＤ　１３．７０４６ｇ：便通を良くする薬です。指示された用法・用量を守るよう説明しています。
・ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）：月経不順や便秘などを改善する漢方薬です。直射日光を避けて保存するよう説明しています。
・グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」　５０ｍＬ：便通を良くする浣腸剤です。過敏症状が出たら使用を中止し医師に連絡するよう説明しています。
・ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「イワキ」：便通を良くする薬です。目に使用しないよう説明しています。
・ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＹＤ」：骨粗しょう症を改善する薬です。服用後の異常があれば中止し医師に連絡するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　虚血性大腸炎［大腸検査前処置に用いた場合］

居宅療養管理指導　報告書

にしくまもと病院

佐藤　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾖｼ	1943年8月10日　〔 82 歳〕	男性	TEL：
池田　勝義様	〒		

居宅療養管理指導　報告書

にしくまもと病院

佐藤　様

2026　年　1　月　21　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾖｼ	1943年8月10日　〔 82 歳〕	男性	TEL：
池田　勝義様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/19
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

アンテベートローションＯ．０５％　30ｇ
１日１回　頭部

ヘパリン類似物質クリームＯ．３％「日医工」　50ｇ
└[般]ヘパリン類似物質クリーム
アンテベートクリームＯ．０５％　50ｇ
１日１回　両下肢
混合：塗り薬

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」
５０ｍＬ　5個
１回１個　便秘時

訪問日		2026年1月21日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良

指導内容

内服変更なし、経過観察。

■服薬指導
・アンテベートローションＯ．０５％：皮膚の炎症を抑える塗り薬です。刺激感や湿疹が出た場合は使用を中止し、医師に相談するよう説明しています。
・ヘパリン類似物質クリームＯ．３％「日医工」：血行を良くし、痛みや腫れを改善する塗り薬です。発疹やかゆみが出た場合は使用を中止し、医師に相談するよう説明しています。
・アンテベートクリームＯ．０５％：皮膚の炎症を抑える塗り薬です。刺激感や湿疹が出た場合は使用を中止し、医師に相談するよう説明しています。
・グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」５０ｍＬ：便通を良くする浣腸剤です。連続使用は避け、医師の指示通りに使用するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　白内障［眼瞼皮膚への使用、大量または長期の広範囲の使用・ＯＤＴにより］

居宅療養管理指導　報告書

にしくまもと病院

佐藤　様

2026　年　1　月　28　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾖｼ	1943年8月10日　〔 82 歳〕	男性	TEL：
池田　勝義様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/26
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」　１Ｔ
└[般]アゼルニジピン錠16mg
フルイトラン錠１ｍｇ　２Ｔ
└[般]トリクロルメチアジド錠1mg
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
(包)分１　朝食後　14日

エンレスト錠２００ｍｇ　１Ｔ
ジルテック錠１０　１０ｍｇ　１Ｔ
└[般]セチリジン塩酸塩錠10mg
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」　１Ｔ
└[般]ニフェジピン徐放錠10mg（２４時間持続）
(包)分１　夕食後　14日

リオレサール錠５ｍｇ　２Ｔ
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　２Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠330mg
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」　２Ｃ
└[般]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
(包)分２　朝夕食後　14日

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」　３Ｔ
└[般]モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg
(包)１日３回食後服用　14日

デエビゴ錠５ｍｇ　２Ｔ
ベンザリン錠５　５ｍｇ　１Ｔ
└[般]ニトラゼパム錠5mg
センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」　２Ｔ
└[般]センノシド錠12mg
(包)分１　就寝前　14日

モビコール配合内用剤ＨＤ　１３．７０４６ｇ　1包
(包)分１　朝食後　14日

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）　５ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

グーフィス錠５ｍｇ　１Ｔ
(包)分１　夕食前　14日

フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」　１Ｔ
└[般]フロセミド錠10mg
(包)分１　朝食後　22日

訪問日		2026年1月28日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良

指導内容

1/27-フロセミド10mg追加
ピコスルファート内用液残あり、処方なし。

デエビゴ錠５ｍｇ
・DSU(202512-341)
不眠症治療薬です。ALTやASTの上昇が副作用として報告されていると説明しています。

■ハイリスク薬指導
【抗てんかん剤】ベンザリン錠５　５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。

■服薬指導
・アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」：血圧を下げる薬です。めまいやふらつきに注意し、転倒を防ぐよう説明しています。
・フルイトラン錠１ｍｇ：尿量を増やし血圧を下げる薬です。日光を避け、過敏症状が出たら医師に相談するよう説明しています。
・エンレスト錠２００ｍｇ：心臓の働きを助け血圧を下げる薬です。他の薬との併用は医師に相談するよう説明しています。
・ジルテック錠１０　１０ｍｇ：アレルギー症状やかゆみを改善する薬です。眠気に注意し、医師の指示通り服用するよう説明しています。
・ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＮＰ」：血圧を下げ狭心症を改善する薬です。便に錠剤の残渣が出ることがあると説明しています。
・リオレサール錠５ｍｇ：筋肉の緊張を緩める薬です。眠気に注意し、アルコール類を控えるよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。他の薬の使用状況を確認するよう説明しています。
・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」：血流を良くしコレステロールを減らす薬です。高温多湿を避けて保存するよう説明しています。
・モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」：消化管の働きを助ける薬です。異常があればすぐに医師に連絡するよう説明しています。
・デエビゴ錠５ｍｇ：入眠を促す薬です。他の薬の使用状況を確認し、併用時は医師に相談するよう説明しています。
・ベンザリン錠５　５ｍｇ：不安を和らげ入眠を助ける薬です。眠気に注意し、過敏症状が出たら医師に相談するよう説明しています。
・センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」：便通を良くする薬です。長期連用を避け、医師の指示通り服用するよう説明しています。
・モビコール配合内用剤ＨＤ　１３．７０４６ｇ：便通を良くする薬です。水に溶かし速やかに服用し、保存時は冷蔵庫に入れるよう説明しています。
・ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）：月経不順や便秘などを改善する漢方薬です。塩分制限の有無を確認するよう説明しています。
・グーフィス錠５ｍｇ：便通を良くする薬です。高温多湿を避けて保存し、他の薬の使用状況を確認するよう説明しています。
・フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」：尿量を増やし血圧を下げる薬です。服用時間を調整し、異常があれば医師に相談するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　呼吸抑制

居宅療養管理指導　報告書

ひまわり

佐藤　様

2026　年　1　月　7　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
渡邊 直之

ｱﾗｷ ﾖｼｵ	1935年3月4日　〔 90 歳〕	男性	TEL：
荒木　好夫様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/07
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ 末次内科
診療科：　医師：末次　理成

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[前]アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」
オメプラゾール錠１０ｍｇ「トーワ」　１Ｔ
└[前]オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」
ベオーバ錠５０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　朝食後　14日

プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」　2Ｔ
└[前]プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」
ミヤＢＭ錠　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

グーフィス錠５ｍｇ　2Ｔ
(包)分１　朝食前　14日

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）　2.5ｇ
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）　7.5ｇ
(包)１日３回食前服用　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月7日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月21日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

排便は定期的にみられています。腹部膨満感等の訴えは聞かれません。排便コントロール不良時は適宜薬剤の追加等も検討していきます。

■服薬指導
・アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げたり狭心症を改善します。顔のほてりやめまいが出ることがあります。水または唾液で服用できることを説明しています。
・オメプラゾール錠１０ｍｇ「トーワ」：胃潰瘍や胃酸逆流の症状を改善します。指示された用法・用量を守るよう説明しています。
・ベオーバ錠５０ｍｇ：尿の回数や尿意の強さを改善します。他の薬との併用について医師に相談するよう説明しています。
・プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」：神経障害による痛みを抑えます。めまいやむくみが出ることがあります。一定期間服用を続けるよう説明しています。
・ミヤＢＭ錠：腸の調子を整え下痢を改善します。副作用はほとんどありませんが、湿気を避けて保存するよう説明しています。
・グーフィス錠５ｍｇ：便通を良くする薬です。腹痛や下痢が出ることがあります。他の薬の服用状況を確認するよう説明しています。
・ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）：筋肉痛やけいれんを和らげます。発疹やむくみが出ることがあります。過敏症状が出たら医師に連絡するよう説明しています。
・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）：腎炎や腰痛、高血圧などを改善します。他の漢方薬との重複に注意するよう説明しています。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：なし
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：再発再燃を繰り返す逆流性食道炎
　高血圧症(高血圧)
　既往歴：なし
　合併症：なし
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし
●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

次回、副作用確認　溶血性貧血

居宅療養管理指導　報告書

ひまわり

佐藤　様

2026　年　1　月　21　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
渡邊 直之

ｱﾗｷ ﾖｼｵ	1935年3月4日　〔 90 歳〕	男性	TEL：
荒木　好夫様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/21
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[前]アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」
オメプラゾール錠１０ｍｇ「トーワ」　１Ｔ
└[前]オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」
ベオーバ錠５０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　朝食後　14日

プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」　2Ｔ
└[前]プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」
ミヤＢＭ錠　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

グーフィス錠５ｍｇ　2Ｔ
(包)分１　朝食前　14日

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）　2.5ｇ
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）　7.5ｇ
(包)１日３回食前服用　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月21日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年2月4日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

体温などバイタルに問題はありません。体調変わりなく、バイタルも問題なし。健康状態は安定しています。現状の生活習慣を維持することが重要です。

■服薬指導
・アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げたり狭心症を改善する薬です。水または唾液で服用できることを説明しています。
・オメプラゾール錠１０ｍｇ「トーワ」：胃潰瘍や胃酸逆流症状を改善する薬です。他の薬との併用状況を確認するよう説明しています。
・ベオーバ錠５０ｍｇ：尿の回数や尿意の強さを改善する薬です。副作用が現れた場合は医師に相談するよう説明しています。
・プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」：神経障害による痛みを抑える薬です。服用期間を守り、異常があれば医師に相談するよう説明しています。
・ミヤＢＭ錠：腸の調子を整え下痢を改善する薬です。湿気を避けて保存するよう説明しています。
・グーフィス錠５ｍｇ：便通を良くする薬です。飲み忘れた場合は次の食前に服用し、2回分を一度に服用しないよう説明しています。
・ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）：筋肉痛や胃痛など急な痛みを和らげる漢方薬です。他の漢方薬との併用状況を確認するよう説明しています。
・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）：腎炎や腰痛などを改善する漢方薬です。直射日光を避け涼しい場所に保存するよう説明しています。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：なし
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：再発再燃を繰り返す逆流性食道炎
　高血圧症(高血圧)
　既往歴：なし
　合併症：なし
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし
●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

次回、副作用確認　間質性肺炎