居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　6　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ﾐｽﾐ ｷｮｳｺ	1942年12月19日　〔 83 歳〕	女性	TEL：
三角　京子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/06
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」　1Ｔ
└[般]フロセミド錠10mg
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]アムロジピンベシル酸塩錠5mg
アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」　1Ｔ
└[般]アロプリノール錠100mg
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」　1Ｔ
└[般]レバミピド錠100mg
アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]アトルバスタチンカルシウム水和物錠5mg
(包)分１　朝食後　14日

デエビゴ錠５ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　就寝前　14日

モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ　1包
(包)分１　朝食時　14日

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　2Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠330mg
(包)分２　朝夕食後　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月6日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月20日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
体調に変化なく、困り事なく服用できているとの事で、継続服用にて問題ないと判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■服薬指導
・フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」
【効能】尿量を増やして血圧を下げる、むくみを取る、尿路結石の排出を促す、月経前の不快な症状を和らげる薬です。
・アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」
【効能】血圧を下げたり、狭心症を改善する薬です。

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　無顆粒球症
次回、副作用確認　多形紅斑

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ	1936年11月25日　〔 89 歳〕	女性	TEL：
坂本　一子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」　1Ｔ
アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」　1Ｔ
(包)分１　朝食後　21日

ベオーバ錠５０ｍｇ　1Ｔ
ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ニプロ」　1Ｔ
└[前]ソリフェナシンコハク酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」
(包)分１　夕食後　21日

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」　3Ｔ
└[前]酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」
(包)１日３回食後服用　21日

センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」　2Ｔ
└[前]センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
隔日
(包)分１　就寝前　10日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月19日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
体調に変化なく、困り事なく服用できているとの事で、継続服用にて問題ないと判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■服薬指導
・酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」
【効能】過剰な胃酸を中和する、便通を良くする、尿路結石を予防する薬です。
・センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」
【効能】便通を良くする薬です。

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　紅皮症（剥脱性皮膚炎）

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｱﾘﾖｼ ﾘﾂｺ	1927年9月6日　〔 98 歳〕	女性	TEL：
有吉　リツ子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　0.5Ｔ
└[般]アゾセミド錠30mg
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」　1Ｔ
└[般]ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[般]フェブキソスタット錠10mg
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　0.5Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
(包)分１　朝食後　14日

モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ　1包
(包)分１　朝食後　14日

ワルファリンＫ錠１ｍｇ「日新」　1Ｔ
└[前]ワーファリン錠１ｍｇ
(包)分１　夕食後　14日

ベルソムラ錠１５ｍｇ　1Ｔ
ビラノアＯＤ錠２０ｍｇ　1Ｔ
└[前]ビラノア錠２０ｍｇ
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」　1Ｔ
└[般]トラゾドン塩酸塩錠25mg
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）　5ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「パテル」　１０ｃｍ×１４ｃｍ　14枚
└[般]ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm)
１日用量　１枚
(包)１日１枚大腿部貼付

セクターローション３％　50mL
(包)１日１～２回両下腿塗布

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月14日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月28日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

排便は定期的にみられています。排便コントロール不良時は適宜薬剤の追加等も検討していきます。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】ワルファリンＫ錠１ｍｇ「日新」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆「今後、歯科治療や、血が出る検査・手術など受ける場合は、血液サラサラの薬を数日前から休む必要があるかもしれません。
◆副作用◆青あざ、黒い便、歯ぐき出血、血尿、鼻血など目立つか確認。
該当するものはない

※ワーファリン限定「納豆や青汁、しそ等の摂り過ぎは効果が弱まるので控えましょう」と指導した。又、血液のPT-INR値を測定しているか確認。
測っていない

重大副作用　急性腎障害　無
└初期症状　発疹　無
└初期症状　腹痛　無

■服薬指導
・アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：尿量を増やしてむくみを取る薬です。甘草を含む薬との併用に注意するよう説明しています。
・ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」：血圧を下げ、狭心症や不整脈を改善します。使用中の薬を確認するよう説明しています。
・フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血中の尿酸を下げる薬です。痛風発作時は自己判断せず医師に相談するよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げ、むくみを取る薬です。他の薬の使用状況を確認するよう説明しています。
・モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ：便通を良くする薬です。水に溶かして服用し、溶解後は速やかに飲むよう説明しています。
・ワルファリンＫ錠１ｍｇ「日新」：血液が固まるのを抑え、血栓を防ぐ薬です。出血の有無や予定手術を医師に伝えるよう説明しています。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：なし
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：なし
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし
●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

次回、副作用確認　持続性勃起

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

2026　年　1　月　28　日　報告

ｱﾘﾖｼ ﾘﾂｺ	1927年9月6日　〔 98 歳〕	女性	TEL：
有吉　リツ子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/26
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　0.5Ｔ
└[般]アゾセミド錠30mg
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」　1Ｔ
└[般]ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[般]フェブキソスタット錠10mg
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　0.5Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
(包)分１　朝食後　14日

モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ　1包
(包)分１　朝食後　14日

ワルファリンＫ錠１ｍｇ「日新」　1Ｔ
└[前]ワーファリン錠１ｍｇ
(包)分１　夕食後　14日

ベルソムラ錠１５ｍｇ　1Ｔ
ビラノアＯＤ錠２０ｍｇ　1Ｔ
└[前]ビラノア錠２０ｍｇ
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」　1Ｔ
└[般]トラゾドン塩酸塩錠25mg
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）　5ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「パテル」　１０ｃｍ×１４ｃｍ　14枚
└[般]ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm)
１日用量　１枚
(包)１日１枚大腿部貼付

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」　５ｍＬ　3瓶
└[般]ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%5mL
(包)１日２回両眼点眼

サンピロ点眼液２％　５ｍＬ　3瓶
(包)１日２回両眼点眼

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」　５ｍＬ　3瓶
└[般]ピレノキシン点眼液0.005%5mL
(包)１日２回両眼点眼

シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」　５ｍＬ　3瓶
└[般]シアノコバラミン点眼液0.02%5mL
(包)１日３回左眼点眼

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッ

訪問日		2026年1月28日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年2月11日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

特に問題は認められません。食思も良好にて経過を観察していきます。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】ワルファリンＫ錠１ｍｇ「日新」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆「今後、歯科治療や、血が出る検査・手術など受ける場合は、血液サラサラの薬を数日前から休む必要があるかもしれません。
◆副作用◆青あざ、黒い便、歯ぐき出血、血尿、鼻血など目立つか確認。
該当するものはない

※ワーファリン限定「納豆や青汁、しそ等の摂り過ぎは効果が弱まるので控えましょう」と指導した。又、血液のPT-INR値を測定しているか確認。
測っていない

■服薬指導
・アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：尿量を増やしてむくみを取る薬です。甘草を含む薬との併用に注意が必要です。他の薬の服用状況を確認するよう説明しています。
・ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」：血圧を下げ、狭心症や不整脈を改善する薬です。自己判断で中止せず、医師の指示を守るよう説明しています。
・フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血中の尿酸を下げる薬です。痛風発作時は自己判断で中止せず、主治医に相談するよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げ、むくみを取る薬です。夜間の排尿を避けたい場合は服用時間を医師に相談するよう説明しています。
・モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ：便通を良くする薬です。下痢や腹痛が起こることがあります。指示された用法・用量を守るよう説明しています。
・ワルファリンＫ錠１ｍｇ「日新」：血液が固まるのを抑え、血栓を防ぐ薬です。定期的に受診し、指示された検査を必ず受けるよう説明しています。
・ベルソムラ錠１５ｍｇ：入眠を促す薬です。服用後は眠気が残ることがあるため、車の運転や危険な作業を避けるよう説明しています。
・ビラノアＯＤ錠２０ｍｇ：アレルギー性鼻炎やじんましんの症状を改善する薬です。水なしでも服用可能で、服用方法を守るよう説明しています。
・トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」：うつ状態を改善する薬です。過敏症状が現れた場合は服用を中止し、すぐに医師に連絡するよう説明しています。
・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）：腎炎や腰痛などを改善する漢方薬です。他の漢方薬との重複に注意し、服用状況を確認するよう説明しています。
・ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「パテル」：炎症を和らげ痛みを抑える貼り薬です。湿疹や傷のある部位には使用しないよう説明しています。
・ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」：角膜や結膜を保護し傷の治癒を促す点眼薬です。副作用が現れた場合はすぐに医師に連絡するよう説明しています。
・サンピロ点眼液２％　５ｍＬ：眼圧を下げ瞳を縮小させる点眼薬です。視界が暗くなることがあるため、転倒に注意するよう説明しています。
・ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」：白内障の進行を抑える点眼薬です。使用前によく振り、コンタクトレンズは外して点眼するよう説明しています。
・シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」：目のピント調節機能を改善

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　28　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｱﾘﾖｼ ﾘﾂｺ	1927年9月6日　〔 98 歳〕	女性	TEL：
有吉　リツ子様	〒		

トー」　2.5mL
└[般]ラタノプロスト点眼液0.005%
(包)１日１回入浴前右眼点眼

併用薬

併用薬なし

する点眼薬です。コンタクトレンズは外して点眼し、５分以上経過後に装用するよう説明しています。
・ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」：眼圧を下げる点眼薬です。虹彩の色素沈着が起こる可能性があるため、異変があれば主治医に連絡するよう説明しています。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：なし
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：なし
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし
●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

次回、副作用確認　心不全

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾏﾂｵｶ ｷﾐｺ	1957年8月14日　〔 68 歳〕	女性	TEL：
松岡　喜美子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ジャヌビア錠２５ｍｇ　1Ｔ
エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「トーワ」　1Ｃ
└[般]エルデカルシトールカプセル0.75μｇ
(包)分１　朝食後　14日

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」　1Ｔ
└[般]アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg
ルパフィン錠１０ｍｇ　1Ｔ
アミティーザカプセル２４μｇ　1Ｃ
タケキャブ錠１０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　夕食後　14日

ミヤＢＭ錠　2Ｔ
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」　2Ｔ
└[前]ムコスタ錠１００ｍｇ
カロナール錠３００　３００ｍｇ　2Ｔ
└[般]アセトアミノフェン錠300mg
(包)分２　朝夕食後　14日

モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ　1包
(包)分１　朝食時　14日

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）　5ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」　3Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠500mg
ガスコン錠４０ｍｇ　6Ｔ
└[般]ジメチコン錠40mg
(包)１日３回食後服用　14日

ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」　14枚
└[般]ツロブテロールテープ2mg
(包)１日１枚　胸に

併用薬

あおば病院
バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ錠
ゾルピデム酒石酸塩５ｍｇ錠

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月19日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		本人
管理方法		カレンダー
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

■ハイリスク薬指導
【糖尿病用剤】ジャヌビア錠２５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆Sick Day時の対処法について指導。
◆アドヒアランス◆注射剤の保管方法や手技、針の取り扱い方法などを指導。

■服薬指導
・ジャヌビア錠２５ｍｇ：血糖値を下げる薬です。低血糖や便秘などの副作用が現れることがあります。定期的に受診し、指示された検査を必ず受けるよう説明しています。
・エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「トーワ」：骨粗しょう症を改善する薬です。他の薬の服用状況を確認し、定期的に受診するよう説明しています。
・アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」：たんを出しやすくする薬です。湿気を避けて保存し、水または唾液で服用する方法を説明しています。
・ルパフィン錠１０ｍｇ：湿疹やじんましん、アレルギー性鼻炎の症状を改善します。アルコールで副作用が増強するため注意するよう説明しています。
・アミティーザカプセル２４μｇ：便通を良くする薬です。副作用が現れた場合は、すぐに医師や薬剤師に連絡するよう説明しています。
・タケキャブ錠１０ｍｇ：胃潰瘍や逆流性食道炎を改善する薬です。飲み忘れた場合の対応や服用間隔について説明しています。
・ミヤＢＭ錠：腸の調子を整え、下痢を改善する薬です。湿気を避けて保存するよう説明しています。
・レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」：胃粘膜を保護修復する薬です。過敏症状が現れた場合は中止し、医師や薬剤師に連絡するよう説明しています。
・カロナール錠３００　３００ｍｇ：痛みを抑えたり熱を下げる薬です。飲酒を控え、副作用が現れた場合は医師に相談するよう説明しています。
・モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ：便通を良くする薬です。水に溶かして服用し、高温を避けて保存するよう説明しています。
・ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）：おなかの冷えや痛みを改善する漢方薬です。過敏症状が現れた場合は中止し、医師や薬剤師に連絡するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し、便通を良くする薬です。カルシウム摂取量に注意し、副作用を防ぐため長期使用を避けるよう説明しています。
・ガスコン錠４０ｍｇ：胃腸内のガスを除く薬です。副作用が現れた場合は、すぐに医師や薬剤師に連絡するよう説明しています。
・ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」：気管支を広げて呼吸を楽にする貼り薬です。毎回貼る場所を変え、湿疹や傷を避けて使用するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　イレウス

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　19　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾏﾂｵｶ ｷﾐｺ	1957年8月14日　〔 68 歳〕	女性	TEL：
松岡　喜美子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/19
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ジャヌビア錠２５ｍｇ　1Ｔ
エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「トーワ」　1Ｃ
└[般]エルデカルシトールカプセル0.75μｇ
(包)分１　朝食後　14日

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」　1Ｔ
└[般]アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg
ルパフィン錠１０ｍｇ　1Ｔ
アミティーザカプセル２４μｇ　1Ｃ
タケキャブ錠１０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　夕食後　14日

ミヤＢＭ錠　2Ｔ
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」　2Ｔ
└[前]ムコスタ錠１００ｍｇ
カロナール錠３００　３００ｍｇ　2Ｔ
└[般]アセトアミノフェン錠300mg
(包)分２　朝夕食後　14日

モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ　1包
(包)分１　朝食時　14日

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）　5ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」　3Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠500mg
ガスコン錠４０ｍｇ　6Ｔ
└[般]ジメチコン錠40mg
(包)１日３回食後服用　14日

ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」　14枚
└[般]ツロブテロールテープ2mg
(包)１日１枚　胸に

併用薬

あおば病院
バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ錠
ゾルピデム酒石酸塩５ｍｇ錠

訪問日		2026年1月19日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年2月2日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		本人
管理方法		カレンダー
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。

■ハイリスク薬指導
【糖尿病用剤】ジャヌビア錠２５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆Sick Day時の対処法について指導。
◆アドヒアランス◆注射剤の保管方法や手技、針の取り扱い方法などを指導。

■服薬指導
・ジャヌビア錠２５ｍｇ：血糖値を下げる薬です。低血糖症状が出た場合は糖分を摂取し、医師に相談するよう説明しています。
・エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「トーワ」：骨粗しょう症を改善する薬です。高カルシウム血症の症状が出た場合は医師に相談するよう説明しています。
・アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」：たんを出しやすくする薬です。過敏症状が出た場合は服用を中止し医師に相談するよう説明しています。
・ルパフィン錠１０ｍｇ：湿疹やじんましん、アレルギー性鼻炎の症状を改善する薬です。グレープフルーツの飲食を避けるよう説明しています。
・アミティーザカプセル２４μｇ：便通を良くする薬です。飲み忘れた場合は次回分を服用し、２回分を一度に服用しないよう説明しています。
・タケキャブ錠１０ｍｇ：胃潰瘍や食道炎を改善する薬です。指示された用法・用量を守るよう説明しています。
・ミヤＢＭ錠：腸の調子を整え、下痢を改善する薬です。湿気を避けて保存するよう説明しています。
・レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」：胃粘膜を保護修復する薬です。過敏症状が出た場合は服用を中止し医師に相談するよう説明しています。
・カロナール錠３００　３００ｍｇ：痛みを抑えたり熱を下げる薬です。空腹時を避け、多めの水で服用するよう説明しています。
・モビコール配合内用剤ＬＤ　６．８５２３ｇ：便通を良くする薬です。過敏症状が出た場合は服用を中止し医師に相談するよう説明しています。
・ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）：おなかの冷えや痛みを改善する漢方薬です。他の漢方薬服用の有無を確認するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。他の薬やサプリメント使用の有無を確認するよう説明しています。
・ガスコン錠４０ｍｇ：胃腸内のガスを除く薬です。副作用が出た場合は医師に相談するよう説明しています。
・ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」：気管支を広げて呼吸を楽にする貼り薬です。小児には手の届かない部位に貼るよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　依存性

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ	1932年12月6日　〔 93 歳〕	女性	TEL：
佐藤　順子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：御幸病院
診療科：訪問診療　医師：髙井　英二

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[般]ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
(包)分１　朝食後　14日

エンレスト錠２００ｍｇ　２Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[般]アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg
(包)分１　朝食後　14日

ビオフェルミン配合散　６ｇ
(包)１日３回食後服用　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月14日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月28日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
体調に変化なく、困り事なく服用できているとの事で、継続服用にて問題ないと判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■服薬指導
・アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」
【効能】血圧を下げたり、狭心症を改善する薬です。
・ビオフェルミン配合散
【効能】腸の調子を整え、下痢などを改善する薬です。

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　横紋筋融解症

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
渡邊 直之

ｶﾈｶﾜ ﾖﾘｺ	1945年1月2日　〔 81 歳〕	女性	TEL：
金川　順子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」　1Ｔ
└[前]ソリフェナシンコハク酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」
エゼチミブ錠１０ｍｇ「サワイ」　1Ｔ
└[前]エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」
(包)分１　朝食後　35日

メチコバール錠５００μｇ　０．５ｍｇ　3Ｔ
└[前]メコバラミン錠５００（ツルハラ）０．５ｍｇ
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」　3Ｔ
(包)１日３回食後服用　35日

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」　2Ｔ
└[前]ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」
(包)分２　朝夕食後　35日

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」3Ｔ
└[前]酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」
(包)１日３回食後服用　35日

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」　3Ｔ
└[般]リマプロスト　アルファデクス錠5μｇ
(包)１日３回食後服用　35日

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」2Ｔ
└[般]ロキソプロフェンナトリウム水和物錠60mg
(包)分２　朝夕食後　35日

アローゼン顆粒　0.5ｇ
(包)分１　就寝前　35日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		1カ月毎
次回訪問日		2026年2月5日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		本人
管理方法		カレンダー
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

夜間入眠状況問題ありません。夜間に覚醒および不穏等なく、今後も日中の傾眠や覚醒不良等、定期的な観察が必要です。

■服薬指導
・ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」：尿の回数や尿意の強さを改善する薬です。口の乾燥や便秘が現れることがあります。緑内障の有無を確認するよう説明しています。
・エゼチミブ錠１０ｍｇ「サワイ」：血中コレステロールを減らす薬です。食事療法や運動療法を併用してください。他の薬の服用状況を確認するよう説明しています。
・メチコバール錠５００μｇ：末梢神経障害による痛みやしびれを改善する薬です。湿気や光を避けて保存するよう説明しています。
・レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」：胃粘膜を保護修復する薬です。便秘や発疹が現れることがあります。過敏症状が出た場合は医師に連絡するよう説明しています。
・ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」：胃炎や胃酸逆流による症状を改善する薬です。便秘や下痢が現れることがあります。湿気を避けて保存するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。下痢が現れることがあります。腎障害や高齢者の使用状況を確認するよう説明しています。
・リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」：血流を良くする薬です。発疹や発熱が現れることがあります。過敏症状が出た場合は医師に連絡するよう説明しています。
・ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」：炎症を和らげ、痛みや熱を抑える薬です。胃の不快感や眠気が現れることがあります。空腹時を避けて服用するよう説明しています。
・アローゼン顆粒：便通を良くする薬です。腹痛や吐き気が現れることがあります。長期連用を避け、医師の指示通りに服用するよう説明しています。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：なし
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：
　脂質異常症
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし
●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

次回、副作用確認　中毒性表皮壊死融解症（Ｔｏｘｉｃ　Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｎｅｃｒｏｌｙｓｉｓ：ＴＥＮ）

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　13　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
渡邊 直之

ｶﾈｶﾜ ﾖﾘｺ	1945年1月2日　〔 81 歳〕	女性	TEL：
金川　順子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/13
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」　100ｇ
└[前]ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」
患部に塗布

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月13日
訪問頻度		1カ月毎
次回訪問日		2026年2月13日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		本人
管理方法		カレンダー
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

体温などバイタルに問題はありません。体調変わりなく、バイタルも問題なし。健康状態は安定しています。現状の生活習慣を維持することが重要です。

■服薬指導
・ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」：血行を良くし、痛みや腫れを改善する塗り薬です。皮膚の炎症やかゆみ、発疹などが現れることがあります。出血しやすい場合は使用を控え、異常があれば医師に相談するよう説明しています。

■指導相手
・本人
氏名：金川　順子
年齢：81

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
気になる体調の変化があるとの事で、具体的な体調の変化をヒアリングし、副作用などの恐れがないか確認の必要があると判断した。
乾燥肌

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■処方変化
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」　●初回投与

■服薬指導
・ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」
【効能】血行を良くし、痛みや腫れ、炎症を改善する塗り薬です。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：あり
　乾燥肌
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：
　脂質異常症
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　13　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
渡邊 直之

ｶﾈｶﾜ ﾖﾘｺ	1945年1月2日　〔 81 歳〕	女性	TEL：
金川　順子様	〒		

●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

お肌の状態確認　ヘパリン使用状況確認

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ｻｺﾀﾞ ﾊﾙｵ	1957年2月21日　〔 69 歳〕	男性	TEL：
迫田　春夫様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[前]オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[前]ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」
(包)分１　朝食後　21日

メネシット配合錠１００　4Ｔ
└[前]ドパコール配合錠Ｌ１００
不均等（0-1.5-1.5-1-0）
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ　3Ｔ
(包)１日３回食後服用　21日

イーケプラ錠５００ｍｇ　2Ｔ
└[前]レベチラセタム錠２５０ｍｇ「トーワ」
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」　2Ｔ
└[前]シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」
(包)分２　朝夕食後　21日

ベタニス錠５０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　夕食後　21日

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　4Ｔ
└[前]酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」
(包)分２　朝夕食後　21日

センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」　2Ｔ
└[前]センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
(包)分１　就寝前　21日

カロナール錠２００　２００ｍｇ　6Ｔ
└[般]アセトアミノフェン錠200mg
(包)１日３回食後服用　21日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		1カ月毎
次回訪問日		2026年2月5日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
体調に変化なく、困り事なく服用できているとの事で、継続服用にて問題ないと判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。

■服薬指導
・オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【効能】血圧を下げる薬です。
・センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」
【効能】便通を良くする薬です。
【指導】長期連用すると薬の効果が弱まり、薬に頼りがちになることがあるので、医師の指示通りに服用するよう説明。

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　血管性浮腫

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ｻｺﾀﾞ ﾊﾙｵ	1957年2月21日　〔 69 歳〕	男性	TEL：
迫田　春夫様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[前]オルメサルタン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[前]ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」
(包)分１　朝食後　21日

メネシット配合錠１００　4Ｔ
└[前]ドパコール配合錠Ｌ１００
不均等（0-1.5-1.5-1-0）
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ　3Ｔ
(包)１日３回食後服用　21日

イーケプラ錠５００ｍｇ　2Ｔ
└[前]レベチラセタム錠２５０ｍｇ「トーワ」
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」　2Ｔ
└[前]シロスタゾール錠１００ｍｇ「サワイ」
(包)分２　朝夕食後　21日

ベタニス錠５０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　夕食後　21日

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　4Ｔ
└[前]酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」
(包)分２　朝夕食後　21日

センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」　2Ｔ
└[前]センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
(包)分１　就寝前　21日

カロナール錠２００　２００ｍｇ　6Ｔ
└[般]アセトアミノフェン錠200mg
(包)１日３回食後服用　21日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		1カ月毎
次回訪問日		2026年2月5日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
体調に変化なく、困り事なく服用できているとの事で、継続服用にて問題ないと判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】シロスタゾール錠１００ｍｇ「ケミファ」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。

■服薬指導
・メネシット配合錠１００
【効能】パーキンソン症候群の症状を改善する薬です。
・酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」
【効能】過剰な胃酸を中和する、便通を良くする、尿路結石を予防する薬です。
・センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」
【効能】便通を良くする薬です。

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　中毒性表皮壊死融解症（Ｔｏｘｉｃ　Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｎｅｃｒｏｌｙｓｉｓ：ＴＥＮ）

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　6　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾊﾏﾀﾞ ﾌﾐ	1944年2月4日　〔 82 歳〕	女性	TEL：
濱田　史様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/06
医療機関：くまもと南部広域病院
診療科：訪問診療科　医師：丹羽　典子

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」　４Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠250mg
(包)分２　朝夕食後　28日

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」　１Ｔ
└[般]バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg
(包)分１　夕食後　28日

リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカタ」　１Ｔ
└[前]リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」
(包)分１　夕食後　28日

ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」　0.5Ｔ
└[般]ラメルテオン錠8mg
(包)分１　就寝前　28日

オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　１Ｔ
└[般]オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠10mg
(包)分１　朝食後　28日

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」　３Ｔ
└[般]ロキソプロフェンナトリウム水和物錠60mg
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」　３Ｔ
└[般]レバミピド錠100mg
(包)１日３回食後服用　28日

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[般]ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠15mg
(包)分１　朝食後　28日

レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」　5mL
└[般]レボフロキサシン水和物点眼液0.5%
(包)１日４回両眼点眼

プロペト　100ｇ
(包)１日１～２回

訪問日		2026年1月6日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。
レボフロ点眼初処方（オフロキサシン点眼は過去歴あり）
プロペト残無し処方あり

■ハイリスク薬指導
【抗てんかん剤】バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆効果◆最近の発作頻度など自覚症状は改善しているか確認。
改善している
◆効果◆最近の発作頻度など自覚症状は改善しているか確認。
改善している

■服薬指導
・酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。高カルシウム血症に注意が必要と説明しています。
・バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」：てんかん発作や気分の不安定を抑える薬です。かまずに服用するよう説明しています。
・リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「タカタ」：興奮や不安を抑え気分を安定させる薬です。水または唾液で飲み込むよう説明しています。
・ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」：入眠を促す薬です。食直後の服用を避け、就寝直前に服用するよう説明しています。
・オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血圧を下げる薬です。他の薬との併用時は医師に相談するよう説明しています。
・ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」：炎症を和らげ痛みや熱を抑える薬です。空腹時を避けて服用するよう説明しています。
・レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」：胃粘膜を保護修復する薬です。過敏症状が出た場合は中止し医師に相談するよう説明しています。
・ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」：胃潰瘍や逆流性食道炎を改善する薬です。水または唾液で服用するよう説明しています。
・レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」：細菌感染症を治療する点眼薬です。複数の点眼剤使用時は５分以上間隔を空けるよう説明しています。
・プロペト：皮膚を保護する塗り薬です。過敏症状が出た場合は中止し医師に相談するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　血管性浮腫

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　13　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
渡邊 直之

ｲﾜｻｷ ｷﾖｺ	1939年1月4日　〔 87 歳〕	女性	TEL：
岩﨑　清子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/13
医療機関：医療法人　ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧｲﾌﾞ末次内科
診療科：　医師：末次　理成

エリキュース錠２．５ｍｇ　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　35日

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」　1Ｔ
└[前]エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」
(包)分１　朝食後　35日

フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」　1Ｔ
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　1Ｔ
└[前]スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」
(包)分１　朝食後　35日

ベオーバ錠５０ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　夕食後　35日

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」　1Ｔ
└[前]モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニプロ」
(包)分１　就寝前　35日

レスタミンコーワクリーム１％　10ｇ
└[般]ジフェンヒドラミンクリーム1%
(包)患部に塗布

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月13日
訪問頻度		1カ月毎
次回訪問日		2026年2月13日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		家族
管理方法		カレンダー
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服状況は問題ありません。拒薬等なく、内服状況は問題なし。引き続き、口腔内貯留や嚥下機能低下などがないか観察していきます。

O　かゆみあり→レスタミンコーワクリーム追加となる

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】エリキュース錠２．５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆「今後、歯科治療や、血が出る検査・手術など受ける場合は、血液サラサラの薬を数日前から休む必要があるかもしれません。
◆副作用◆青あざ、黒い便、歯ぐき出血、血尿、鼻血など目立つか確認。
該当するものはない

重大副作用　出血　無
└初期症状　意識を失う　無
└初期症状　たんに血が混じる　無

■服薬指導
・エリキュース錠２．５ｍｇ：血液が固まるのを抑え、血栓を防ぐ薬です。出血しやすい場合は医師に相談するよう説明しています。
・エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」：ぜんそくやアレルギー症状を改善します。眠気や吐き気が出たら医師に相談するよう説明しています。
・フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」：尿量を増やし血圧を下げる薬です。夜間の排尿を避けたい場合は医師に相談するよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げる薬です。夜間の排尿を避けたい場合は医師に相談するよう説明しています。
・ベオーバ錠５０ｍｇ：尿の回数や尿意を改善する薬です。服用中の他の薬がある場合は医師に相談するよう説明しています。
・モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」：ぜんそくやアレルギー性鼻炎を予防する薬です。過敏症状が出たら医師に相談するよう説明しています。
・レスタミンコーワクリーム１％：皮膚のかゆみや炎症を抑える塗り薬です。異常が出た場合は使用を中止し医師に相談するよう説明しています。

●後発品希望：希望する
●お薬手帳：貼付
●体調変化：なし
●服薬状況：良い
●残薬：なし
●疾患：現病名：
　心不全
　既往歴：なし
　合併症：なし
●副作用：なし
●他科受診・併用薬剤：なし
●禁忌薬剤：なし
●OTC：なし
●健康食品・飲食物：なし

連絡事項

次回、副作用確認　汎血球減少症

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　8　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｺ	1929年1月5日　〔 97 歳〕	女性	TEL：
福田　ヤス子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/08
医療機関：御幸病院
診療科：訪問診療　医師：西上　和宏

カデックス軟膏０．９％　40ｇ
└[般]ヨウ素軟膏0.9%
(包)１日１回左下肢塗布

エプレレノン錠５０ｍｇ「杏林」　１Ｔ
└[般]エプレレノン錠50mg
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
(包)分１　夕食後　15日

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」鉄５０ｍｇ　１Ｔ
└[般]クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
(包)分１　夕食後　14日

チラーヂンＳ錠１２．５μｇ　１Ｔ
(包)分１　朝食後　14日

ニゾラールクリーム２％　20ｇ
└[般]ケトコナゾールクリーム2%
(包)１日１回左下腿と左趾の間塗布

ルコナック爪外用液５％　3.5ｇ
(包)１日１回足の爪塗布

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月8日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月22日
調剤形態		一包化（別包無）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

朝の血圧が、上が80と、かなり低値なことから、朝食後に服用されていた利尿剤が４剤、昼食後に変更となった。むくみがひどく、左下肢から滲出液も出ており、アスパラカリウム散からエプレレノンに変更となった。
また、採血の結果から、貧血改善のクエン酸第一鉄Na錠、甲状腺ホルモンを補うチラーヂンが追加となった。
左下腿、左趾から真菌も検出されたため、真菌薬の塗り薬も追加となっている。

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
気になる体調の変化があるとの事で、具体的な体調の変化をヒアリングし、副作用などの恐れがないか確認の必要があると判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■処方変化
カデックス軟膏０．９％　●初回投与
エプレレノン錠５０ｍｇ「杏林」　●初回投与
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」　鉄５０ｍｇ　●初回投与
チラーヂンＳ錠１２．５μｇ　●初回投与
ニゾラールクリーム２％　●初回投与
ルコナック爪外用液５％　●初回投与

■服薬指導
・カデックス軟膏０．９％
【効能】床ずれ(褥瘡(じょくそう))や皮膚の潰瘍を改善する塗り薬です。
・エプレレノン錠５０ｍｇ「杏林」
【効能】血圧を下げたり、他の薬と併用して心臓の働きを助ける薬です。
・クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」　鉄５０ｍｇ
【効能】鉄の不足による貧血を改善する薬です。
・チラーヂンＳ錠１２．５μｇ
【効能】甲状腺ホルモンの不足を補う薬です。
・ニゾラールクリーム２％
【効能】かび(真菌)の感染による皮膚疾患(水虫、たむし、カンジダ症、癜風、脂漏性皮膚炎)を治療する塗り薬です。
・ルコナック爪外用液５％
【効能】かび(真菌)による感染症(爪の水虫)を治療する塗り薬です。

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　8　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｺ	1929年1月5日　〔 97 歳〕	女性	TEL：
福田　ヤス子様	〒		

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　黄疸
次回、副作用確認　高カリウム血症

居宅療養管理指導　報告書

ふれあい共生

浦田　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
角﨑 さくら

ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｺ	1929年1月5日　〔 97 歳〕	女性	TEL：
福田　ヤス子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：御幸病院
診療科：訪問診療　医師：髙井　英二

フォシーガ錠１０ｍｇ　1Ｔ
ダーブロック錠６ｍｇ　1Ｔ
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[般]フェブキソスタット錠10mg
チラーヂンＳ錠１２．５μｇ　1Ｔ
(包)分１　朝食後　14日

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[般]アゾセミド錠30mg
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」　1Ｔ
└[般]ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
フルイトラン錠１ｍｇ　1Ｔ
└[般]トリクロルメチアジド錠1mg
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
トルバプタンＯＤ錠１５ｍｇ「オーツカ」　1Ｔ
└[般]トルバプタン口腔内崩壊錠15mg
(包)分１　昼食後　14日

ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」　1Ｔ
└[般]ラメルテオン錠8mg
エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」　1Ｔ
└[般]エスゾピクロン錠1mg
(包)分１　就寝前　14日

エリキュース錠２．５ｍｇ　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

ミヤＢＭ錠　3Ｔ
(包)１日３回食後服用　14日

タリージェＯＤ錠２．５ｍｇ　1Ｔ
└[前]タリージェ錠２．５ｍｇ
エプレレノン錠５０ｍｇ「杏林」　1Ｔ
└[般]エプレレノン錠50mg
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」鉄５０ｍｇ　1Ｔ
└[般]クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
(包)分１　夕食後　14日

カデックス軟膏０．９％　120ｇ
(包)１日１回左下肢塗布

ニゾラールクリーム２％　50ｇ
└[般]ケトコナゾールクリーム2%
(包)１日１回左下腿と左趾の間塗布

ルコナック爪外用液５％　3.5ｇ
(包)１日１回足の爪塗布

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月14日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月28日
調剤形態		一包化（別包無）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

以前と比べてむくみが減ってきているご様子です。前回利尿薬を朝から昼の変更しましたが、朝の低血圧は相変わらず続いています。

■指導相手
・施設職員

■後発品希望
後発医薬品での処方を希望する事を確認した。

■お薬手帳
ご持参いただいたお薬手帳に、今回の処方内容を反映したシールを貼付。

■体調変化
気になる体調の変化があるとの事で、具体的な体調の変化をヒアリングし、副作用などの恐れがないか確認の必要があると判断した。

■服薬状況
ヒアリングの結果、従前の服薬指導に基づき服薬していることから、服薬状況は良好と判断した。

■残薬
ヒアリングの結果、適切な範囲内の残薬数にて推移している事から、余剰な残薬はないと判断した（アドヒアランス良好）。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】エリキュース錠２．５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。

■服薬指導
・エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」
【効能】不安や緊張を和らげ、入眠を促し、よく眠れるようにする薬です。
・カデックス軟膏０．９％
【効能】床ずれ(褥瘡(じょくそう))や皮膚の潰瘍を改善する塗り薬です。
・ニゾラールクリーム２％
【効能】かび(真菌)の感染による皮膚疾患(水虫、たむし、カンジダ症、癜風、脂漏性皮膚炎)を治療する塗り薬です。
・ルコナック爪外用液５％
【効能】かび(真菌)による感染症(爪の水虫)を治療する塗り薬です。

施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり

連絡事項

次回、副作用確認　ショック