居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｳｴﾉ ﾕﾀｶ	1940年12月28日　〔 85 歳〕	男性	TEL：
上野　穣様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」　2Ｔ
└[般]ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg
(包)分２　朝昼食後　14日

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　2Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ　1Ｔ
アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1.5Ｔ
└[般]アゾセミド錠30mg
アミティーザカプセル２４μｇ　1Ｃ
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1Ｔ
└[般]フェブキソスタット錠10mg
(包)分１　朝食後　14日

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」　2Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠250mg
クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」　1.5Ｔ
└[般]クエチアピンフマル酸塩錠25mg
不均等（0-0.5-1-0-0）
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」　2Ｔ
└[般]モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg
(包)分２　朝昼食後　14日

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）　5ｇ
(包)１日２回朝・昼食前　14日

ビソノテープ２ｍｇ　14枚
(包)１日１枚胸・上腕部・背部貼付

プロペト　100ｇ
(包)１日１～２回全身塗布

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月14日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月28日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
プロペト残無し、処方あり
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆「今後、歯科治療や、血が出る検査・手術など受ける場合は、血液サラサラの薬を数日前から休む必要があるかもしれません。

■服薬指導
・ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」：胃粘膜を保護修復する薬です。発疹や腫れなどの過敏症状が出た場合は、すぐに医師に連絡するよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げたり、むくみを取る薬です。服用時間は医師に相談するよう説明しています。
・リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ：血液が固まるのを抑え、血栓を防ぐ薬です。出血や貧血の症状が出た場合は、医師に相談するよう説明しています。
・アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：尿量を増やしてむくみを取る薬です。使用中の風邪薬や解熱剤がある場合は、医師に相談するよう説明しています。
・アミティーザカプセル２４μｇ：便通を良くする薬です。飲み忘れた場合は次回分を服用し、2回分を一度に飲まないよう説明しています。
・フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血中の尿酸を下げる薬です。痛風発作時は自己判断せず、主治医に相談するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し、便通を良くする薬です。併用薬がある場合は医師に相談するよう説明しています。
・クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」：興奮や不安を抑え、気分を安定させる薬です。糖尿病の有無を確認するよう説明しています。
・モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」：消化管の働きを活発にする薬です。自己判断で長期使用しないよう説明しています。
・ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）：おなかの冷えや痛みを改善する漢方薬です。過敏症状が出た場合は、すぐに医師に連絡するよう説明しています。
・ビソノテープ２ｍｇ：不整脈を改善する貼り薬です。使用直前に袋から取り出し、保存方法を守るよう説明しています。
・プロペト：皮膚を保護する塗り薬です。発疹や刺激感が出た場合は、使用を中止し医師に相談するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　深部静脈血栓症

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　26　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｳｴﾉ ﾕﾀｶ	1940年12月28日　〔 85 歳〕	男性	TEL：
上野　穣様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/26
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」　２Ｔ
└[般]ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg
(包)分２　朝昼食後　14日

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　２Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ　１Ｔ
アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　1.5Ｔ
└[般]アゾセミド錠30mg
アミティーザカプセル２４μｇ　１Ｃ
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　１Ｔ
└[般]フェブキソスタット錠10mg
(包)分１　朝食後　14日

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」　２Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠250mg
クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」　1.5Ｔ
└[般]クエチアピンフマル酸塩錠25mg
不均等（0-0.5-1-0-0）
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」　２Ｔ
└[般]モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg
(包)分２　朝昼食後　14日

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）　５ｇ
(包)１日２回朝・昼食前　14日

ビソノテープ２ｍｇ　14枚
(包)１日１枚胸・上腕部・背部貼付

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月26日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年2月9日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
プロペト残あり、処方なし。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ
・DSU(202512-341)
血液を固まりにくくする薬です。重大な出血のリスクに注意するように説明しています。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆「今後、歯科治療や、血が出る検査・手術など受ける場合は、血液サラサラの薬を数日前から休む必要があるかもしれません。
◆副作用◆青あざ、黒い便、歯ぐき出血、血尿、鼻血など目立つか確認。
該当するものはない

■服薬指導
・ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」：胃粘膜を保護修復する薬です。便秘や吐き気が現れることがあります。他に服用中の薬があるか確認するよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げたり、むくみを取る薬です。定期的に受診し、指示された検査を必ず受けるよう説明しています。
・リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ：血液が固まるのを抑え、血栓を防ぐ薬です。検査結果を確認し、必要時は医師や薬剤師に相談するよう説明しています。
・アゾセミド錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：尿量を増やしむくみを取る薬です。他に服用中の薬があるか確認するよう説明しています。
・アミティーザカプセル２４μｇ：便通を良くする薬です。下痢や吐き気が現れることがあります。副作用が出た場合はすぐに医師に連絡するよう説明しています。
・フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血中の尿酸を下げる薬です。過敏症状が現れた場合は中止し、すぐに医師に連絡するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。使用中の薬やサプリメントを確認するよう説明しています。
・クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」：興奮や不安を抑え、気分を安定させる薬です。高血糖症状がないか確認するよう説明しています。
・モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＺＥ」：消化管の働きを活発にする薬です。体調に異変があれば直ちに医師に連絡するよう説明しています。
・ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）：おなかの冷えや痛みを改善する漢方薬です。直射日光を避け、涼しい所に保存するよう説明しています。
・ビソノテープ２ｍｇ：不整脈を改善する貼り薬です。説明書をよく読んでから使用するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　麻痺性イレウス

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｼﾞｮｳｻｺ ｼｹﾞﾉﾘ	1952年12月5日　〔 73 歳〕	男性	TEL：
城迫　重則様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]ナフトピジル錠25mg
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]クロピドグレル硫酸塩錠75mg
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]アムロジピンベシル酸塩錠2.5mg
タケキャブ錠２０ｍｇ　1Ｔ
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　2Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠330mg
(包)分１　朝食後　14日

プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」　0.5Ｔ
└[般]プラバスタチンナトリウム錠5mg
(包)分１　夕食後　14日

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」　0.5Ｔ
└[般]フルニトラゼパム錠1mg
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」　1Ｔ
└[般]ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
(包)分１　就寝前　14日

ミヤＢＭ錠　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月19日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。

■ハイリスク薬指導
【血液凝固阻止剤】クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆アドヒアランス◆「今後、歯科治療や、血が出る検査・手術など受ける場合は、血液サラサラの薬を数日前から休む必要があるかもしれません。
◆副作用◆青あざ、黒い便、歯ぐき出血、血尿、鼻血など目立つか確認。
該当するものはない

■服薬指導
・ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」：尿の出にくさを改善する薬です。めまいや立ちくらみに注意し、転倒を防ぐよう説明しています。
・クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」：血液を固まりにくくし、血流を改善する薬です。出血しやすい場合は医師に相談するよう説明しています。
・アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げ、狭心症を改善する薬です。めまいやふらつきに注意し、転倒を防ぐよう説明しています。
・タケキャブ錠２０ｍｇ：胃潰瘍や逆流性食道炎を改善する薬です。飲み忘れた場合の対応を守るよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し、便通を良くする薬です。体調の変化があればすぐに医師に相談するよう説明しています。
・プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」：コレステロールを減らす薬です。過敏症状が出た場合は服用を中止し、医師に相談するよう説明しています。
・フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」：不安を和らげ、入眠を助ける薬です。アルコールとの併用を避けるよう説明しています。
・ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」：入眠を助ける薬です。翌日の眠気や注意力低下に注意し、車の運転を避けるよう説明しています。
・ミヤＢＭ錠：腸の調子を整え、下痢を改善する薬です。湿気を避けて保存するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　好酸球性肺炎

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾂｺ	1935年6月1日　〔 90 歳〕	女性	TEL：
松永　加津子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」　２Ｔ
└[般]ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[般]ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠15mg
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　0.5Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
(包)分１　朝食後　14日

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　2Ｔ
└[般]オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠20mg
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」　２Ｔ
└[般]ニフェジピン徐放錠20mg（２４時間持続）
(包)分２　朝夕食後　14日

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　2Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠330mg
(包)分２　朝昼食後　14日

エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」　１Ｔ
└[般]エスゾピクロン錠1mg
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）　５ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

アンテベート軟膏０．０５％　10ｇ
(包)１日１～２回両下腿塗布

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」　2.5mL
└[般]ラタノプロスト点眼液0.005%
(包)１日１回両眼点眼

併用薬

併用薬なし

訪問日	2026年1月14日
訪問頻度	2週間毎
次回訪問日	2026年1月28日
調剤形態	一包化（別包有）
服薬管理者	施設
管理方法	配薬BOX
服薬　残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。
アンテベート、ラタノプロスト点眼液残無し、処方あり

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
・DSU(202509-339)
高血圧治療薬です。血管性浮腫の副作用に注意し、症状が出た場合は速やかに医師に相談するよう説明しています。

■ハイリスク薬指導
【不整脈用剤】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。

■服薬指導
・ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」：血圧を下げ、狭心症や不整脈を改善します。めまいやふらつきが起こることがあるため、転倒や車の運転に注意するよう説明しています。
・ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」：胃潰瘍や逆流性食道炎を改善し、ピロリ菌除菌にも使います。飲み忘れた場合は、次の服用まで８時間以上空けるよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げ、むくみを取ります。めまいやふらつきに注意し、定期的に検査を受けるよう説明しています。
・オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血圧を下げる薬です。他の薬を併用する際は必ず医師や薬剤師に相談し、湿気を避けて保存するよう説明しています。
・ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」：血圧を下げ、狭心症を改善します。めまいやふらつきに注意し、車の運転や危険な作業を避けるよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くします。高マグネシウム血症の症状が出た場合は服用を中止し、直ちに受診するよう説明しています。
・エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」：不安を和らげ、入眠を促します。翌日も眠気や注意力低下が起こることがあるため、車の運転や危険な作業を避けるよう説明しています。
・ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）：神経症や不眠症、小児夜泣きなどを改善する漢方薬です。他に服用中の薬がある場合は必ず医師や薬剤師に伝えるよう説明しています。
・アンテベート軟膏０．０５％：皮膚の炎症を抑える塗り薬です。水ぼうそうや化膿した患部には使用せず、目に入らないよう注意するよう説明しています。
・ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」：眼圧を下げる点眼薬です。点眼後は目を閉じて目頭を軽く押さえ、他に使用中の薬がある場合は確認するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　貧血

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　28　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾂｺ	1935年6月1日　〔 90 歳〕	女性	TEL：
松永　加津子様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/26
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」　２Ｔ
└[般]ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」　１Ｔ
└[般]ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠15mg
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　0.5Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
(包)分１　朝食後　14日

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　2Ｔ
└[般]オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠20mg
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」　２Ｔ
└[般]ニフェジピン徐放錠20mg（２４時間持続）
(包)分２　朝夕食後　14日

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」　2Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠330mg
(包)分２　朝昼食後　14日

エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」　１Ｔ
└[般]エスゾピクロン錠1mg
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）　５ｇ
(包)分２　朝夕食前　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日	2026年1月28日
訪問頻度	2週間毎
次回訪問日	2026年2月11日
調剤形態	一包化（別包有）
服薬管理者	施設
管理方法	配薬BOX
服薬　残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
アンテベート、ラタノプロスト点眼液残あり、処方なし。

■ハイリスク薬指導
【不整脈用剤】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆副作用◆ふらつき・動悸・低血糖等の症状確認。及び催不整脈発生時の対処法を説明。
問題なし
◆効果◆最近の発作頻度など自覚症状は改善しているか確認。
改善している
◆相互作用◆QT延長を増長しやすい薬剤の確認。
重大副作用　完全房室ブロック　無
└初期症状　立ちくらみ　無
└初期症状　胸の不快感　無

■服薬指導
・ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」：血圧を下げ、狭心症や不整脈を改善します。めまいやふらつきが起こることがあるため、転倒や運転に注意するよう説明しています。
・ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」：胃潰瘍や胃酸逆流を改善し、ピロリ菌除菌にも使います。飲み忘れた場合の対応を説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げ、むくみを取ります。過敏症状が出た場合は服用を中止し、医師に連絡するよう説明しています。
・オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」：血圧を下げる薬です。めまいや頭痛などの副作用があるため、体調に異変があれば医師に相談するよう説明しています。
・ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」：血圧を下げ、狭心症を改善します。便に錠剤の形が残ることがあると説明しています。
・酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くします。高マグネシウム血症のリスクがあるため、長期服用や腎疾患の有無を確認するよう説明しています。
・エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＹＤ」：不安を和らげ、入眠を促す薬です。過敏症状が出た場合は服用を中止し、医師に連絡するよう説明しています。
・ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）：神経症や不眠症を改善する漢方薬です。過敏症状が出た場合は服用を中止し、医師に連絡するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　意識障害

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｸﾄﾞｳ ｲﾁﾛｳ	1948年10月9日　〔 77 歳〕	男性	TEL：
久道　一郎様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」　1Ｔ
└[般]フロセミド錠20mg
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg
(包)分１　朝食後　14日

アローゼン顆粒　0.5ｇ
└[般]センナ・センナ実配合顆粒
(包)分１　夕食後　14日

センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」　1Ｔ
└[般]センノシド錠12mg
酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」　2Ｔ
└[般]酸化マグネシウム錠500mg
ベンザリン錠５　５ｍｇ　2Ｔ
└[般]ニトラゼパム錠5mg
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」　1Ｔ
└[般]エチゾラム錠0.5mg
(包)分１　就寝前　14日

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）　7.5ｇ
(包)１日３回食前服用　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月19日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。

■ハイリスク薬指導
【抗てんかん剤】ベンザリン錠５　５ｍｇ
◆処方◆注意（用法・用量・投与期間・休薬期間等）して活用すれば、安全で効果的な薬であることを説明。
◆効果◆最近の発作頻度など自覚症状は改善しているか確認。
改善している
◆効果◆最近の発作頻度など自覚症状は改善しているか確認。
改善している

■服薬指導
・フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」：尿量を増やし血圧を下げ、むくみを取る薬です。体調に異変があれば医師に相談するよう説明しています。
・アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げ、狭心症を改善する薬です。歯肉肥厚が現れた場合は医師に相談するよう説明しています。
・アローゼン顆粒：便通を良くする薬です。尿が黄褐色や赤色になることがあると説明しています。
・センノシド錠１２ｍｇ「ＴＣＫ」：便通を良くする薬です。長期使用は避け、医師の指示通り服用するよう説明しています。
・酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」：胃酸を中和し便通を良くする薬です。体調変化時は医師に相談するよう説明しています。
・ベンザリン錠５　５ｍｇ：不安や緊張を和らげ、眠りを助ける薬です。運動失調が現れた場合は医師に相談するよう説明しています。
・エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」：不安や緊張を和らげ、筋肉をほぐす薬です。運動失調が現れた場合は医師に相談するよう説明しています。
・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）：腎炎や高血圧などを改善する漢方薬です。過敏症状が現れた場合は医師に相談するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　錯乱

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ｻﾄｳ ｾｼﾐ	1938年3月15日　〔 87 歳〕	女性	TEL：
佐藤　征支美様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」　１μｇ　1Ｔ
└[般]アルファカルシドールカプセル1μｇ
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠15mg
バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]バルサルタン錠40mg
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]アムロジピンベシル酸塩錠2.5mg
(包)分１　朝食後　14日

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」　1Ｔ
└[般]メマンチン塩酸塩錠5mg
ベルソムラ錠１５ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　就寝前　14日

ミヤＢＭ錠　2Ｔ
アスパラカリウム錠３００ｍｇ　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

カロナール錠３００　３００ｍｇ　4Ｔ
└[般]アセトアミノフェン錠300mg
(包)分４　毎食後寝前　14日

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月19日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。

■服薬指導
・ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」：記憶力や思考力の減退を遅らせる薬です。湿気を避け、遮光保存するよう説明しています。
・アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」：ビタミンＤを補い、骨や筋肉の症状を改善します。過敏症状が出た場合は医師に連絡するよう説明しています。
・ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」：胃潰瘍や胃酸逆流の症状を改善します。水またはだ液で服用する方法を説明しています。
・バルサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げる薬です。解熱剤や鎮痛剤の併用に注意し、医師に相談するよう説明しています。
・アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げたり狭心症を改善します。転倒や危険作業に注意するよう説明しています。
・メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」：記憶力や思考力の減退を遅らせる薬です。他の薬の服用状況を確認するよう説明しています。
・ベルソムラ錠１５ｍｇ：入眠を促す薬です。翌日以降の眠気や注意力低下に注意し、危険作業を避けるよう説明しています。
・ミヤＢＭ錠：腸の調子を整え、下痢を改善します。湿気を避けて保存するよう説明しています。
・アスパラカリウム錠３００ｍｇ：カリウム不足を補う薬です。湿気を避け、服用直前に包装から取り出すよう説明しています。
・カロナール錠３００　３００ｍｇ：痛みを抑えたり熱を下げる薬です。空腹時を避け、多めの水で服用するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎［ヘリコバクター・ピロリの除菌に用いるアモキシシリン、クラリスロマイシンにおいて］

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　5　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾉﾔﾏ ｼﾙｺ	1929年2月20日　〔 97 歳〕	女性	TEL：
野山　シルコ様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/05
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

シムビコートタービュヘイラー６０吸入
1ｷｯﾄ
└[般]ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物配合吸入剤60吸入
後発医薬品を調剤しなかった理由：保険薬局の備蓄
１日２回朝・眠前２吸入

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月5日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月19日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服状況は問題ありません。拒薬等なく、内服状況は問題なし。

■吸入薬指導
シムビコートタービュヘイラー６０吸入
・同意確認：医師からの要請→本人の承諾済み
・医療機関への情報提供：お薬手帳
・事前準備：薬の残量を確認してください。／薬剤を正しくセットしてください。
・吸入方法：息を軽く吐いてください。／正しい吸い込み方を守ってください。／吸入後、そのまま３～５秒息を止めてください。／息をゆっくり吐きだしてください。
・吸入回数：正しい吸入回数を守ってください。
・吸入後：うがいをしてください。
・保管方法：直射日光を避け、室温で湿気の少ない場所に保管してください。／定期的に吸入口の清掃をしてください。
・総合判定：手技を十分理解していると判断した
文書及び練習用吸入器等を使用して、以上の指導を行った

■服薬指導
・シムビコートタービュヘイラー６０吸入：気管支を広げ、炎症を抑えて呼吸を楽にする吸入薬です。使用後は閉栓して保管するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　重篤な血清カリウム値の低下

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　14　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾉﾔﾏ ｼﾙｺ	1929年2月20日　〔 97 歳〕	女性	TEL：
野山　シルコ様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/14
医療機関：医療法人きたの胃腸科内科
診療科：　医師：一瀬　景輔

タケキャブ錠２０ｍｇ　1Ｔ
フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」　1Ｔ
└[般]フロセミド錠20mg
チラーヂンＳ錠２５μｇ　1Ｔ
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」　1Ｔ
└[般]アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg
(包)分１　朝食後　14日

デエビゴ錠２．５ｍｇ　1Ｔ
(包)分１　就寝前　14日

アスパラカリウム錠３００ｍｇ　2Ｔ
(包)分２　朝夕食後　14日

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　1Ｔ
└[般]スピロノラクトン錠25mg
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」　1Ｔ
└[般]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
(包)分１　朝食後　14日

ヘパリン類似物質クリーム０．３％「日医工」　50ｇ
└[般]ヘパリン類似物質クリーム
アンテベートクリーム０．０５％　50ｇ
(包)１日１～２回胸下・脇下塗布
混合：塗り薬

併用薬

併用薬なし

訪問日		2026年1月14日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年1月28日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。
施設管理および内服コンプライアンス不安定のため一包化指示あり、一包化で管理中。
ヘパリンクリーム、アンテベートクリーム混合の処方あり

■服薬指導
・タケキャブ錠２０ｍｇ：胃潰瘍や逆流性食道炎を改善する薬です。飲み忘れた場合の対応を説明しています。
・フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」：尿量を増やし血圧を下げる薬です。めまいやふらつきに注意するよう説明しています。
・チラーヂンＳ錠２５μｇ：甲状腺ホルモンを補う薬です。副作用が出た場合はすぐに医師に連絡するよう説明しています。
・アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」：血圧を下げ狭心症を改善する薬です。グレープフルーツとの併用を避けるよう説明しています。
・デエビゴ錠２．５ｍｇ：入眠を促す薬です。翌朝の眠気や注意力低下に注意し、車の運転を避けるよう説明しています。
・アスパラカリウム錠３００ｍｇ：カリウム不足を補う薬です。湿気を避けて保存し、定期的に検査を受けるよう説明しています。
・スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」：尿量を増やし血圧を下げる薬です。めまいやふらつきに注意し、転倒を防ぐよう説明しています。
・エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」：血圧を下げ心臓を助ける薬です。過敏症状が出た場合はすぐに医師に連絡するよう説明しています。
・ヘパリン類似物質クリーム０．３％「日医工」：血行を良くし炎症を改善する塗り薬です。出血しやすい方は医師に相談するよう説明しています。
・アンテベートクリーム０．０５％：皮膚の炎症を抑える薬です。過敏症状が出た場合は使用を中止し医師に連絡するよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　心筋梗塞

居宅療養管理指導　報告書

ケアサポートプラス

深水　様

2026　年　1　月　28　日　報告

共生薬局 在宅調剤センター南店
熊本市南区御幸笛田６丁目７－１
TEL 096-237-6326 FAX 096-237-6327
古場 脩太

ﾉﾔﾏ ｼﾙｺ	1929年2月20日　〔 97 歳〕	女性	TEL：
野山　シルコ様	〒		

処方内容

処方日：2026/01/28
医療機関：さんさん眼科クリニック
診療科：　医師：榮木　大輔

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」　2.5mL
└[般]ラタノプロスト点眼液0.005%
１日１回入浴前両眼点眼

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」　５ｍＬ　1瓶
└[般]ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%5mL
１日４回両眼点眼

レバミピド懸濁性点眼液２％「参天」　５ｍＬ　1瓶
└[般]レバミピド点眼液2%5mL
１日４回両眼点眼

併用薬

処方日：2026/01/28
医療機関：さんさん眼科クリニック
診療科：　医師：榮木　大輔

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」　2.5mL
└[般]ラタノプロスト点眼液0.005%
１日１回入浴前両眼点眼

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」　５ｍＬ　1瓶
└[般]ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%5mL
１日４回両眼点眼

レバミピド懸濁性点眼液２％「参天」　５ｍＬ　1瓶
└[般]レバミピド点眼液2%5mL
１日４回両眼点眼

訪問日		2026年1月28日
訪問頻度		2週間毎
次回訪問日		2026年2月11日
調剤形態		一包化（別包有）
服薬管理者		施設
管理方法		配薬BOX
服薬	服薬状況	良
	残薬	◎残薬：無

指導内容

内服変更なし、経過観察。

■服薬指導
・ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」：眼圧を下げる点眼薬です。まぶたの炎症や目の刺激感などが現れることがあります。１日１回を超えて使用しないよう説明しています。
・ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」　５ｍＬ：角膜や結膜を保護し、傷の治癒を促す点眼薬です。副作用が現れた場合は、すぐに医師、薬剤師に連絡するよう説明しています。
・レバミピド懸濁性点眼液２％「参天」　５ｍＬ：ドライアイを改善する点眼薬です。目の刺激感や頭痛などが現れることがあります。使用前にキャップを閉じたままよく振るよう説明しています。

連絡事項

次回、副作用確認　涙道閉塞、涙嚢炎