ESERCIZIO 6

Gestire agitazione e rifiuto

Rispondere ai comportamenti difficili senza conflitto

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Nessuno	Al bisogno	Quando necessario

Obiettivi

- ✓ Ridurre il disagio della persona
- ✓ Proteggere la relazione terapeutica

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Fermati

Interrompi la richiesta e mantieni un tono calmo.



Cerca la causa

Dolore, fame, bagno, stanchezza, troppi stimoli.



Distrai

Proponi un'attività piacevole o una musica conosciuta.



Riprova

Ripresenta l'esercizio più tardi o in forma diversa.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Ridurre stimoli e richieste	Riproporre l'attività in forma di gioco

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Strategie condivise	Il caregiver usa le stesse strategie di distrazione	quando serve

! **Nota per il professionista.** Il comportamento è spesso un modo per comunicare un bisogno non espresso.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.