ESERCIZIO 73

Modellare la plastilina

Rinforzare le mani e stimolare la creatività

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Plastilina o pasta di sale	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare le mani e stimolare la creatività
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Ammorbidisci
Schiaccia e impasta.



Pallina
Forma una pallina.



Rotolo
Forma un serpentello.



Forma libera
Crea una forma semplice.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pasta morbida e forme semplici	Forme più complesse

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Impasto	Impastare pasta di sale insieme	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Il gesto di impastare richiama spesso ricordi della cucina.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.