ESERCIZIO 74

Mettere le mollette

Allenare la pinza tra pollice e indice

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Mollette, bordo di una scatola	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la pinza tra pollice e indice
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Prendi una molletta.



Apri
Stringila per aprirla.



Fissa
Attaccala al bordo della scatola.



Togli
Toglile una alla volta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Mollette morbide e grandi	Seguire una sequenza di colori

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Stendere i panni	Stendere piccoli capi con le mollette	quando c'è bucato

! **Nota per il professionista.** Un gesto domestico conosciuto diventa esercizio.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.