ESERCIZIO 75

Travasare con il cucchiaio

Allenare il controllo del gesto e la stabilità

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Cucchiaio, riso o legumi secchi, due ciotole	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare il controllo del gesto e la stabilità
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Ciotole

Ciotola piena e ciotola vuota.



Cucchiaio

Prendi un cucchiaio di riso.



Trasporta

Portalo all'altra ciotola.



Versa

Versa senza far cadere.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Cucchiaio grande e ciotole vicine	Cucchiaino e ciotole lontane

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Travaso	Travasare legumi secchi	5 minuti

! **Nota per il professionista.** Supervisione costante con legumi e oggetti piccoli.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.