ESERCIZIO 77

Puzzle a pezzi grandi

Allenare coordinazione e percezione visiva

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Puzzle da 6 a 24 pezzi grandi	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare coordinazione e percezione visiva
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Immagine
Mostra l'immagine completa.



Bordi
Inizia dai pezzi dei bordi.



Completa
Inserisci i pezzi centrali.



Commenta
Racconta l'immagine.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Puzzle da 4 o 6 pezzi	Puzzle da 24 o più pezzi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Puzzle	Un puzzle con immagini familiari	15 minuti

! **Nota per il professionista.** Scegli immagini adulte e significative, non infantili.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.