ESERCIZIO 78

Avvitare e svitare

Allenare la rotazione del polso e la presa

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Barattoli con coperchio, bulloni grandi	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la rotazione del polso e la presa
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Barattolo
Prendi un barattolo chiuso.



Svita
Svita il coperchio.



Guarda
Guarda cosa c'è dentro.



Avvita
Richiudi il barattolo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Barattoli larghi e coperchi morbidi	Bulloni e dadi grandi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Barattoli	Aprire e chiudere i barattoli della dispensa	5 barattoli

! **Nota per il professionista.** Aprire barattoli è un gesto utile nell'autonomia in cucina.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.