ESERCIZIO 84

Cucire con ago a punta tonda

Allenare coordinazione fine bimanuale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Cartoncino forato, laccio con punta	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare coordinazione fine bimanuale
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Cartoncino

Cartoncino con fori grandi.



Infila

Passa il laccio nel primo foro.



Prosegui

Segui i fori in ordine.



Completa

Completa il disegno.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Fori molto grandi e pochi	Disegni più complessi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Cucito	Cartoncini da cucire con il caregiver	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Le attività di cucito sono spesso familiari e rilassanti.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.