
MÓDULO VI · PROTOCOLO 05

Doble curva mayor


Por curva

OBJETIVO

Equilibrar el tronco sobre la pelvis y trabajar cada curva por separado sin descompensar la otra.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

QUÉ OBSERVAR

Dos curvas de sentido contrario, torácica y lumbar, con apex en regiones distintas.

PRIORIDADES DE LA SESIÓN

Autoelongación global, corrección frente al espejo y trabajo diferenciado por curva.

SECUENCIA DE TRABAJO

1. Autoelongación de pie (3.1).
2. Corrección del desplazamiento del tronco (3.6).
3. Elongación de cada lado cóncavo en sesiones alternas (3.9).
4. Respiración costal (5.2).
5. Estabilización global (4.1, 4.5 y 4.6).

DOSIFICACIÓN

Sesión de 45 minutos, 2 o 3 veces por semana.

PROGRESIÓN

Integra la marcha corregida (3.14).

ERROR FRECUENTE

Corregir una curva y agravar la compensación de la otra.

PRECAUCIONES

Vigila de cerca la evolución y coordina los controles con el médico.