
MÓDULO VI · PROTOCOLO 13

# Escoliosis del adolescente en pico de crecimiento


Por curva

**OBJETIVO**

Reforzar la vigilancia y la adherencia durante el crecimiento rápido.




Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.




Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

## QUÉ OBSERVAR

Adolescente con crecimiento rápido y madurez esquelética baja.

## PRIORIDADES DE LA SESIÓN

Mayor frecuencia de reevaluación y refuerzo de la adherencia.

## SECUENCIA DE TRABAJO

1. Reevaluación cada 4 semanas (2.8).
2. Autoelongación y corrección frente al espejo (3.1 y 3.5).
3. Estabilización global (4.1, 4.5 y 4.6).
4. Respiración costal (5.2).
5. Comunica al médico cualquier cambio.

## DOSIFICACIÓN

Sesión de 45 minutos, 2 o 3 veces por semana.

## PROGRESIÓN

Añade el equilibrio unipodal (4.10).

## ERROR FRECUENTE

Espaciar los controles durante el crecimiento rápido.

## PRECAUCIONES

Durante el pico de crecimiento el riesgo de progresión es mayor.