
MÓDULO III · PROTOCOLO 04

Movilización pélvica en sedestación sobre pelota


Inicial

OBJETIVO

Disociar el movimiento de la pelvis del tronco y mejorar el control lumbopélvico.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Curvas lumbares, toracolumbares y desnivel pélvico.

POSICIÓN INICIAL

Sentado sobre una pelota con caderas y rodillas a unos 90 grados, pies apoyados y manos en la cintura.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Balancea la pelvis hacia delante y hacia atrás sin mover los hombros.
2. Repite de lado a lado, llevando el peso a cada isquion.
3. Haz círculos pequeños en ambos sentidos.
4. Termina en la posición neutra con el tronco alargado.

DOSIFICACIÓN

2 series de 10 movimientos en cada dirección.

PROGRESIÓN

Eleva un pie del suelo manteniendo la pelvis nivelada.

ERRORES FRECUENTES

Dejar caer el tronco o encoger los hombros.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.