MÓDULO III · PROTOCOLO 09

Elongación del lado cóncavo en decúbito lateral sobre rodillo


Intermedio

OBJETIVO

Abrir el lado cóncavo de la curva y mejorar la expansión de las costillas.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Curvas torácicas y toracolumbares.

POSICIÓN INICIAL

Tumbado sobre el lado de la convexidad, con un rodillo o toalla enrollada bajo el vértice de la curva. Brazo superior sobre la cabeza.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Coloca el rodillo bajo el vértice de la curva.
2. Alarga el brazo superior y la pierna superior en direcciones opuestas.
3. Respira hacia el lado cóncavo, que queda arriba.
4. Mantén de 30 a 60 segundos y cambia de posición despacio.

DOSIFICACIÓN

2 series de 30 a 60 segundos.

PROGRESIÓN

Añade la respiración con resistencia manual (protocolo 5.4).

ERRORES FRECUENTES

Rotar el tronco hacia atrás o bloquear la respiración.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.