
MÓDULO IV · PROTOCOLO 01

Activación del transverso del abdomen en supino


Inicial

OBJETIVO

Activar la musculatura profunda que estabiliza la columna.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Primer ejercicio de estabilización para todos los pacientes.

POSICIÓN INICIAL

Tumbado boca arriba, rodillas flexionadas, manos sobre la parte baja del abdomen.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Inspira por la nariz sin mover el abdomen.
2. Al espirar, aproxima suavemente el ombligo hacia la columna.
3. Siente cómo se tensa el abdomen bajo las manos, sin mover la pelvis.
4. Mantén 10 segundos respirando con normalidad.

DOSIFICACIÓN

3 series de 8 repeticiones de 10 segundos.

PROGRESIÓN

Añade el movimiento alterno de una pierna.

ERRORES FRECUENTES

Contener la respiración o aplanar la lumbar con fuerza.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.