PROTOCOLLO 70

Test di flessione cranio-cervicale

Valutare il controllo dei flessori profondi del collo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	10 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Dolore cervicale associato
- ✓ Cefalea
- ✓ Postura con capo in avanti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Posizione

Supino, ginocchia flesse, biofeedback a pressione sotto il collo gonfiato a 20 mmHg.

2



FASE 2

Movimento

Annuisci lentamente senza sollevare il capo.

3



FASE 3

Livelli

Raggiungi e mantieni 22, 24, 26, 28 e 30 mmHg.

4



FASE 4

Valutazione

Registra il livello mantenuto 10 secondi senza compensi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	10 secondi per livello
Livelli	da 22 a 30 mmHg
Compensi	superficiali, retrazione, apnea

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Osserva lo SCM: deve restare rilassato
- ✓ Movimento piccolo e lento
- ✓ Registra il livello raggiunto

Errori da evitare

- ! Sollevare il capo
- ! Spingere con la lingua o i denti
- ! Trattenere il respiro

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Annuire lento	Piccolo cenno di sì da supino mantenuto 10 secondi	10 ripetizioni, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** Il test diventa anche esercizio: si allena al livello raggiunto con buona qualità.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.