PROTOCOLLO 71

Allenamento dei flessori profondi del collo

Migliorare il controllo cervicale con progressione del test cranio-cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Deficit al test di flessione cranio-cervicale
- ✓ Cefalea cervicogenica
- ✓ Dolore cervicale associato ai DTM

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Livello di partenza

Inizia dal livello mantenuto senza compensi.

2



FASE 2

Tenuta

Mantieni 10 secondi respirando normalmente.

3



FASE 3

Ripetizioni

Ripeti fino a 10 volte con buona qualità.

4



FASE 4

Progressione

Sali di 2 mmHg quando completi 10 x 10 secondi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	10 secondi
Ripetizioni	10
Frequenza	1 volta al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Qualità prima della quantità
- ✓ Lingua rilassata al palato
- ✓ Progressione lenta

Errori da evitare

- ! Usare i muscoli superficiali
- ! Saltare i livelli
- ! Allenarsi con dolore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Flessione cranio-cervicale	Cenno di sì da supino con asciugamano sotto il collo	10 x 10 secondi, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** L'allenamento dei flessori profondi riduce il dolore cervicale e la cefalea associata.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.