PROTOCOLLO 75

# Rinforzo dei muscoli scapolari

Migliorare la postura del cingolo scapolare

| FASE | QUADRO CLINICO | DURATA | FREQUENZA |
|---|---|---|---|
| Subacuta e cronica | DTM con componente cervicale | 8 a 10 minuti | 2 sedute a settimana |

## Indicazioni

- ✓ Spalle anteriorizzate
- ✓ Dolore cervicale e trapezio superiore
- ✓ Lavoro prolungato al computer

## Controindicazioni e precauzioni


- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

## Posizionamento

**Paziente:** in piedi o seduto.

**Fisioterapista:** di fronte al paziente con un elastico.

## Esecuzione passo dopo passo




**Retrazione**

Avvicina le scapole senza sollevare le spalle.




**Depressione**

Abbassa le scapole verso le tasche posteriori.




**Elastico**

Rematore con elastico leggero.




**Postura**

Mantieni il capo allineato.

## Dosaggio

| PARAMETRO | INDICAZIONE |
|---|---|
| **Ripetizioni** | 12 a 15 |
| **Serie** | 2 |
| **Frequenza** | 3 volte a settimana |

## Criteri di rivalutazione

**DOLORE CERVICALE (NRS)**

____ / 10

a riposo e in movimento

**MOBILITÀ**

____ °

rotazione o flessione

**SINTOMI MANDIBOLARI**

**Migliorati / Invariati**

dopo il trattamento

### Punti chiave

- ✓ Controllo prima della forza
- ✓ Spalle basse
- ✓ Respirazione regolare

### Errori da evitare

- ! Sollevare le spalle
- ! Iperestendere il collo
- ! Carichi eccessivi

## Esercizio domiciliare associato

| ESERCIZIO | ESECUZIONE | DOSAGGIO |
|---|---|---|
| **Rematore con elastico** | Tirare l'elastico avvicinando le scapole | 2 x 15, 3 volte a settimana |

! **Nota clinica.** Un cingolo scapolare stabile riduce il sovraccarico del trapezio superiore.

## Bibliografia essenziale


1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.