PROTOCOLLO 79

Stabilità dello sguardo e equilibrio

Integrare controllo posturale e visivo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con instabilità	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Instabilità soggettiva
- ✓ Vertigini associate a dolore cervicale
- ✓ Fase avanzata del recupero

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: in piedi, vicino a un appoggio.

Fisioterapista: accanto al paziente per sicurezza.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Base stabile

In piedi, piedi uniti, occhi aperti.

2



FASE 2

Occhi chiusi

Ripeti a occhi chiusi.

3



FASE 3

Base ridotta

Posizione in tandem.

4



FASE 4

Movimento del capo

Aggiungi rotazioni lente del capo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	30 secondi per posizione
Ripetizioni	3
Frequenza	1 volta al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)

____ / 10

a riposo e in movimento

MOBILITÀ

____°

rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI

Migliorati / Invariati

dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Sicurezza prima di tutto
- ✓ Vicino a un appoggio
- ✓ Progressione graduale

Errori da evitare

- ! Esercizi senza supporto vicino
- ! Progressione troppo rapida
- ! Ignorare cadute o quasi cadute

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Equilibrio in tandem	Piede davanti all'altro vicino a un muro	3 x 30 secondi

! **Nota clinica.** Il controllo posturale integrato completa il trattamento dei pazienti con vertigini cervicogeniche.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.