PROTOCOLLO 81

Integrazione mandibola e collo nel movimento

Coordinare apertura mandibolare e postura cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura con estensione compensatoria del capo
- ✓ Scarso controllo combinato
- ✓ Fase avanzata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto, specchio laterale.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Osservazione

Osserva se il capo si estende durante l'apertura.

2



FASE 2

Correzione

Mantieni il capo neutro con una lieve retrazione.

3



FASE 3

Apertura

Apri lentamente senza estendere il collo.

4



FASE 4

Automatizzazione

Ripeti in attività come parlare e masticare.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	2 al giorno
Supporto	specchio laterale

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Feedback visivo laterale
- ✓ Movimenti lenti
- ✓ Integrazione nella vita quotidiana

Errori da evitare

- ! Estendere il capo per aprire
- ! Velocità elevata
- ! Tensione delle spalle

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con capo neutro	Apertura lenta con mento leggermente retratto	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il controllo combinato riduce i compensi cervicali nei movimenti mandibolari.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.