PROTOCOLLO 82

Respirazione e postura cervicale

Ridurre l'uso dei muscoli accessori respiratori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Respirazione toracica alta
- ✓ Tensione di scaleni e SCM
- ✓ Stress

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino o seduto.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Osservazione

Valuta il movimento di torace e addome.

2



FASE 2

Diaframma

Mani sull'addome, inspirazione nasale.

3



FASE 3

Spalle

Mantieni le spalle rilassate.

4



FASE 4

Integrazione

Combina con la posizione di riposo mandibolare.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	5 minuti
Ritmo	4 secondi in, 6 secondi out
Frequenza	2 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Spalle ferme durante l'inspirazione
- ✓ Respirazione nasale
- ✓ Mandibola rilassata

Errori da evitare

- ! Respirare con le spalle
- ! Respirazione forzata
- ! Bocca aperta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Respirazione diaframmatica	Respirazione nasale lenta con mani sull'addome	5 minuti, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Una respirazione efficiente riduce il sovraccarico dei muscoli cervicali accessori.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.