PROTOCOLLO 88

Desensibilizzazione nel dolore persistente

Ridurre la sensibilità del sistema nervoso nei quadri cronici

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore persistente, sensibilizzazione	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore da oltre 3 mesi
- ✓ Dolore diffuso o sproporzionato
- ✓ Elevata sensibilità al tatto

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Educazione
Spiega il ruolo del sistema nervoso nel dolore persistente.



Stimoli graduati
Tocco leggero e pressioni progressive ben tollerate.



Movimento
Movimenti mandibolari nel range sicuro, aumentando gradualmente.



Contesto
Sonno, stress, attività fisica generale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Intensità	sempre tollerabile
Progressione	settimanale
Attività fisica	30 minuti, 5 giorni a settimana

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Piccoli successi costruiscono fiducia
- ✓ Linguaggio rassicurante
- ✓ Integra attività fisica generale

Errori da evitare

- ! Tecniche dolorose
- ! Focalizzarsi solo sul tessuto
- ! Promettere risultati rapidi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Attività fisica generale	Camminata a ritmo moderato	30 minuti, 5 giorni a settimana

! **Nota clinica.** Nel dolore persistente l'obiettivo principale è la funzione: il dolore segue nel tempo.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.