PROTOCOLLO 91

Ipermobilità e lussazione ricorrente dell'ATM

Migliorare il controllo dell'apertura e prevenire le lussazioni

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Ipermobilità, sublussazione	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura eccessiva con scatto
- ✓ Episodi di bocca bloccata aperta
- ✓ Ipermobilità generalizzata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lussazione in atto non ridotta
- ! Frattura sospetta
- ! Dolore acuto intenso
- ! Tecniche di mobilizzazione in traslazione

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Educazione

Evita aperture massimali, sbadiglia con la lingua al palato.

2



FASE 2

Controllo

Apertura con lingua al palato e isometrie lievi.

3



FASE 3

Stabilizzazione

Esercizi di controllo motorio progressivi.

4



FASE 4

Gestione degli episodi

Spiega cosa fare in caso di blocco e quando andare al pronto soccorso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Esercizi	10 ripetizioni, 3 volte al giorno
Durata	6 a 8 settimane
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il controllo motorio è il cardine del trattamento
- ✓ Mai mobilizzazioni in traslazione
- ✓ Collabora con l'odontoiatra

Errori da evitare

- ! Mobilizzare un'articolazione ipermobile
- ! Esercizi di allungamento in apertura
- ! Ignorare episodi di lussazione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Sbadiglio controllato	Lingua al palato e mano sotto il mento durante lo sbadiglio	a ogni sbadiglio

! **Nota clinica.** In caso di lussazione che non si riduce, il paziente deve rivolgersi al pronto soccorso.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.