PROTOCOLLO 92

Artrosi dell'ATM (malattia degenerativa)

Gestire dolore e funzione nella degenerazione articolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Malattia degenerativa articolare	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Crepitio grossolano
- ✓ Dolore articolare in masticazione
- ✓ Età avanzata o storia di DTM di lunga durata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Educazione
Spiega la natura spesso autolimitante dei sintomi.



Gestione del carico
Dieta adattata e masticazione bilaterale.



Terapia manuale
Distrazione delicata per il dolore.



Esercizio
Mobilità e controllo motorio senza dolore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Terapia manuale	grado I e II
Esercizio	quotidiano
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	____ / 10	Retta / Deviata
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ I sintomi tendono a migliorare nel tempo
- ✓ Gestione del carico, non immobilità
- ✓ Collabora con l'odontoiatra e il medico

Errori da evitare

- ! Comunicare un messaggio di usura irreversibile
- ! Mobilizzazioni aggressive
- ! Dieta eccessivamente restrittiva a lungo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Mobilità quotidiana	Aperture e lateralità lente nel range confortevole	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Molti pazienti con artrosi dell'ATM migliorano con trattamento conservativo nel medio periodo.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.