PROTOCOLLO 95

DTM in età adolescenziale

Adattare valutazione e trattamento ai pazienti adolescenti

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM negli adolescenti	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare in adolescente
- ✓ Parafunzioni legate a studio e smartphone
- ✓ Trattamento ortodontico in corso o recente

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Consenso
Coinvolgi i genitori e ottieni il consenso di entrambi.



Valutazione
Esame DC/TMD semplificato e fattori di vita.



Educazione
Linguaggio semplice, strumenti visivi, obiettivi motivanti.



Programma
Esercizi brevi e promemoria digitali.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	4 a 6
Esercizi	massimo 3, 5 minuti al giorno
Coinvolgimento	famiglia e ortodontista

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Coinvolgi la famiglia
- ✓ Programmi brevi e motivanti
- ✓ Collabora con l'ortodontista

Errori da evitare

- ! Programmi lunghi e complessi
- ! Trascurare stress scolastico e sonno
- ! Trattare senza il consenso dei genitori

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Sfida dei promemoria	Controllo della posizione di riposo con un'app di promemoria	ogni ora durante lo studio

! **Nota clinica.** Negli adolescenti i DTM sono spesso lievi e rispondono bene a educazione ed esercizio.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.