PROTOCOLLO 96

DTM durante il trattamento ortodontico

Gestire i sintomi mandibolari in collaborazione con l'ortodontista

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM e ortodonzia	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare durante il trattamento ortodontico
- ✓ Click comparso durante la terapia
- ✓ Invio da parte dell'ortodontista

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Comunicazione
Confronto con l'ortodontista sulla fase del trattamento.



Valutazione
Esame DC/TMD e misure di base.



Gestione
Autogestione, terapia miofasciale ed esercizio.



Monitoraggio
Aggiornamento periodico all'ortodontista.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	4 a 6
Aggiornamento	ogni 4 sedute
Esercizio	quotidiano

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il fisioterapista non modifica il piano ortodontico
- ✓ Comunicazione regolare
- ✓ Rassicura il paziente

Errori da evitare

- ! Attribuire il problema all'ortodonzia senza dati
- ! Interrompere il dialogo con il collega
- ! Ignorare il dolore ai denti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento quotidiano	Posizione di riposo ed esercizi di apertura controllata	2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La collaborazione tra fisioterapista e ortodontista migliora il comfort e l'aderenza del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.