PROTOCOLLO 99

Collaborazione per la placca occlusale

Integrare il dispositivo prescritto dall'odontoiatra con il trattamento fisioterapico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con placca occlusale	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Paziente con placca occlusale prescritta
- ✓ Dolore persistente nonostante il dispositivo
- ✓ Bruxismo nel sonno

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Informazione
Chiedi tipo di dispositivo, orari di utilizzo e controlli previsti.



Verifica
Controlla aderenza e sintomi al risveglio.



Integrazione
Esercizi e terapia manuale complementari.



Comunicazione
Segnala all'odontoiatra fastidi o cambiamenti del morso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Controllo	a ogni seduta
Comunicazione	ogni 4 sedute
Esercizio	quotidiano

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ La placca è competenza dell'odontoiatra
- ✓ Il trattamento è complementare
- ✓ Monitora cambiamenti occlusali

Errori da evitare

- ! Consigliare modifiche al dispositivo
- ! Ignorare un nuovo fastidio occlusale
- ! Considerare la placca come unica terapia

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Routine del mattino	Esercizi di rilassamento dopo aver tolto la placca	ogni mattina

! **Nota clinica.** Un approccio integrato tra dispositivo, esercizio ed educazione offre i risultati migliori.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.