PROTOCOLLO 100

DTM nei musicisti e nei professionisti della voce

Gestire il carico mandibolare nelle attività professionali specifiche

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM da sovraccarico professionale	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Strumentisti a fiato, violinisti, cantanti, insegnanti
- ✓ Dolore legato alle ore di attività
- ✓ Postura mantenuta a lungo

Controindicazioni e precauzioni


- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Analisi
Osserva la postura e l'attività professionale reale.



Carico
Pianifica pause e gradualità delle sessioni.



Trattamento
Terapia miofasciale e cervicale mirata.



Esercizio
Riscaldamento e defaticamento mandibolare.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pause	ogni 25 a 30 minuti di attività
Riscaldamento	5 minuti
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Rispetta le esigenze professionali
- ✓ Coinvolgi l'insegnante dello strumento o del canto
- ✓ Programmi brevi pre e post attività

Errori da evitare

- ! Consigliare di smettere l'attività
- ! Ignorare la postura dello strumento
- ! Trascurare il collo e le spalle

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Riscaldamento mandibolare	Aperture, lateralità lente e respirazione prima dell'attività	5 minuti prima di suonare o parlare

! **Nota clinica.** La gestione del carico permette di continuare l'attività professionale riducendo il dolore.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.