BONUS 2

Protocollo per bruxismo e sovraccarico mandibolare

Programma di 4 settimane per ridurre l'iperattività dei muscoli masticatori e la tensione persistente

DURATA	SEDUTE	LAVORO A CASA	COLLABORAZIONE
4 settimane	1 o 2 a settimana	10 minuti al giorno	Odontoiatra

Prima di iniziare

- ☐ Distinguere bruxismo da veglia e bruxismo nel sonno
- ☐ Raccogliere i segni: usura dentale, ipertrofia del massetere, dolore al risveglio
- ☐ Coinvolgere l'odontoiatra per la valutazione del dispositivo notturno
- ☐ Sospettare apnee nel sonno in presenza di russamento e sonnolenza diurna

Programma settimana per settimana

SETTIMANA	OBIETTIVO	INTERVENTI
1	Consapevolezza	Educazione, diario delle parafunzioni, promemoria ogni 30 a 60 minuti, posizione di riposo
2	Riduzione del carico	Terapia miofasciale di massetere e temporale, rilassamento, respirazione diaframmatica
3	Controllo motorio	Apertura con lingua al palato, isometrie lievi, gestione dello stress
4	Autonomia	Routine mattutina e serale, piano di riacutizzazione, verifica dei progressi

Routine quotidiana del paziente

MOMENTO	ESERCIZIO	DOSAGGIO
Risveglio	Calore umido, automassaggio del massetere, 5 aperture lente	5 minuti
Durante la giornata	Controllo della posizione di riposo a ogni promemoria	ogni 30 a 60 minuti
Pausa	Respirazione diaframmatica con mandibola rilassata	2 minuti, 3 volte
Sera	Rilassamento progressivo e niente schermi prima di dormire	10 minuti

Monitoraggio

INDICATORE	INIZIO	SETTIMANA 2	SETTIMANA 4
Dolore al risveglio (0 a 10)			
Episodi di serramento notati al giorno			
Dolore alla palpazione del massetere			
Apertura massima (mm)			

! **Messaggio per il paziente.** Il bruxismo è un comportamento che si può gestire: l'obiettivo è ridurre il carico sui muscoli, non eliminarlo del tutto.

Riferimento

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.