PROTOCOLLO 16

Crioterapia nel dolore articolare acuto

Ridurre dolore e infiammazione articolare dopo sovraccarico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta	Artralgia	10 minuti	Fase acuta

Indicazioni

- ✓ Artralgia acuta
- ✓ Dolore dopo cure odontoiatriche prolungate
- ✓ Riacutizzazione dopo trauma minore

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Protezione
Avvolgi il ghiaccio in un panno sottile.



Applicazione
Sulla regione preauricolare del lato dolente.



Durata
10 minuti, poi pausa di almeno 1 ora.



Controllo
Verifica la pelle e la sensibilità.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tempo	10 minuti
Pausa	almeno 1 ora
Periodo	prime 48 a 72 ore

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Utile nelle prime 72 ore
- ✓ Non applicare direttamente sulla pelle
- ✓ Associa riposo funzionale

Errori da evitare

- ! Applicazioni troppo lunghe
- ! Uso in caso di fenomeno di Raynaud
- ! Freddo prima di esercizi di allungamento

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Ghiaccio a domicilio	Applicare 10 minuti protetto da un panno	fino a 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il freddo modula il dolore acuto; nella fase subacuta il calore è spesso più indicato.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.