PROTOCOLLO 19

Respirazione diaframmatica

Ridurre l'attivazione e la tensione cervicale e mandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, stress associato	5 a 10 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Respirazione toracica alta
- ✓ Stress e tensione muscolare
- ✓ Dolore cervicale associato

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: supino con ginocchia flesse o seduto.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Una mano sul torace e una sull'addome.



Inspirazione
Inspira dal naso espandendo l'addome.



Espirazione
Espira lentamente, più a lungo dell'inspirazione.



Integrazione
Mantieni la mandibola rilassata durante l'esercizio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ritmo	inspirazione 4 secondi, espirazione 6
Durata	5 minuti
Frequenza	2 o 3 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Ottimo prima degli esercizi mandibolari
- ✓ Controlla che le spalle non si sollevino
- ✓ Associa la posizione di riposo

Errori da evitare

- ! Respirazione forzata
- ! Iperventilazione
- ! Tensione delle labbra

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Respirazione serale	5 minuti prima di dormire	ogni sera

! **Nota clinica.** La respirazione lenta riduce l'attivazione simpatica, utile nei pazienti con stress e serramento.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.