PROTOCOLLO 20

Posizione di riposo della lingua

Insegnare la postura linguale che riduce il carico sui masticatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, parafunzioni	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Serramento
- ✓ Respirazione orale
- ✓ Interposizione linguale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente con uno specchio.

Esecuzione passo dopo passo



Individuazione
La punta della lingua appena dietro gli incisivi superiori, senza toccarli.



Contatto
Il dorso della lingua si appoggia al palato morbidamente.



Denti separati
Mantieni 2 o 3 mm tra le arcate.



Mantenimento
Respira con il naso nella posizione corretta.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Mantenimento	10 secondi
Frequenza	più volte al giorno

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ È la base per molti esercizi mandibolari
- ✓ Usa lo specchio all'inizio
- ✓ Correggi la pressione eccessiva

Errori da evitare

- ! Spingere forte la lingua sul palato
- ! Bloccare la respirazione
- ! Contrarre le labbra

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Posizione N	Lingua al palato e denti separati	ogni ora per 1 minuto

! **Nota clinica.** La corretta posizione linguale favorisce il rilassamento dei muscoli elevatori.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.