PROTOCOLLO 21

Terapia manuale delicata nella fase acuta

Ridurre il dolore con tecniche di grado I senza sovraccarico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta	Artralgia	5 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore articolare acuto
- ✓ Paziente molto sensibile
- ✓ Prima seduta di terapia manuale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto
Contatto esterno sul corpo della mandibola, senza presa intraorale.



Oscillazioni
Movimenti di piccola ampiezza all'inizio del range.



Ritmo
Lento e regolare, guidato dal comfort.



Rivaluta
Controlla dolore e apertura dopo ogni serie.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I (Maitland)
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	____ / 10	Retta / Deviata
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ L'obiettivo è il sollievo, non l'aumento del range
- ✓ Mantieni un dialogo costante
- ✓ Interrompi se il dolore aumenta

Errori da evitare

- ! Usare gradi elevati in fase acuta
- ! Prese intraorali nel paziente spaventato
- ! Sedute troppo lunghe

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento dolce	Aperture lente nel range senza dolore	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Le tecniche di grado I sfruttano la modulazione del dolore e preparano al lavoro attivo.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.