PROTOCOLLO 30

Mobilizzazione con movimento in lateralità

Ridurre il dolore e la limitazione nei movimenti laterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Lateralità dolorosa
- ✓ Dolore in masticazione unilaterale
- ✓ Limitazione asimmetrica

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di lato al paziente, una mano sul cranio e una sulla mandibola.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Paziente seduto, terapista di lato.



Stabilizzazione
Una mano stabilizza il cranio.



Scivolamento
L'altra mano applica una lieve distrazione mandibolare.



Movimento attivo
Il paziente esegue la lateralità mantenendo la correzione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	6 a 10
Serie	3
Criterio	assenza di dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Cerca la correzione che elimina il dolore
- ✓ Lavora lentamente
- ✓ Rivaluta subito dopo

Errori da evitare

- ! Forzare la lateralità
- ! Pressione sul condotto uditivo
- ! Serie troppo lunghe

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Lateralità guidata	Movimento laterale lento con un dito come guida	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Un effetto immediato sul dolore indica che la tecnica è appropriata per il paziente.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.