PROTOCOLLO 37

Compressione e decompressione articolare controllata

Stimolare la tolleranza al carico articolare in modo graduale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta tardiva	Artralgia in recupero	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Artralgia in fase di recupero
- ✓ Dolore in masticazione residuo
- ✓ Preparazione al ritorno alla dieta normale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente con rulli di cotone.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Rullo di cotone tra i molari del lato da trattare.



Carico leggero
Morso lieve e progressivo per 5 secondi.



Rilascio
Rilascio lento e completo.



Progressione
Aumenta gradualmente l'intensità senza dolore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Intensità	da lieve a moderata
Criterio	assenza di dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il carico graduale migliora la tolleranza
- ✓ Monitora la risposta nelle 24 ore
- ✓ Collega alla ripresa della dieta

Errori da evitare

- ! Carichi massimali
- ! Progressione troppo rapida
- ! Uso in fase acuta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Morso graduato	Morso lieve su rullo di cotone, alternando i lati	10 per lato, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** La progressione del carico va adattata alla risposta del giorno successivo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.