PROTOCOLLO 39

Trigger point del massetere

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal massetere

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a molari, mandibola e orecchio
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Serramento o bruxismo

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Localizzazione

Palpa il massetere tra arcata zigomatica e angolo mandibolare e individua la banda tesa.

2



FASE 2

Compressione ischemica

Comprimi la banda tra pollice intraorale e indice esterno, oppure con presa esterna con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).

3



FASE 3

Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.

4



FASE 4

Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sul decorso di vasi o nervi
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio del massetere	Pressione circolare lenta con due dita sul punto dolente	60 secondi per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il massetere è il muscolo più frequentemente coinvolto nella mialgia masticatoria.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.