PROTOCOLLO 41

# Trigger point dello pterigoideo mediale

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dallo pterigoideo mediale

| FASE | QUADRO CLINICO | DURATA | FREQUENZA |
|---|---|---|---|
| Subacuta e cronica | Dolore miofasciale con riferito | 6 a 8 minuti | 2 sedute a settimana |

## Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a gola, lingua e regione retromandibolare
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore in deglutizione o alla gola

## Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

## Posizionamento

**Paziente:** supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

**Fisioterapista:** alla testa del lettino.

## Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

### Localizzazione

Palpa la faccia interna dell'angolo mandibolare (esterno) o la parete mediale del ramo (interno, con guanto) e individua la banda tesa.

2



FASE 2

### Compressione ischemica

Comprimi con il dito indice guantato o dall'esterno sotto l'angolo mandibolare con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).

3



FASE 3

### Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.

4



FASE 4

### Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

## Dosaggio

| PARAMETRO | INDICAZIONE |
|---|---|
| **Pressione** | fino a dolore 5 su 10 |
| **Tenuta** | 60 a 90 secondi |
| **Ripetizioni** | 2 o 3 per punto |

## Criteri di rivalutazione

**DOLORE ALLA PALPAZIONE**
____ / 10
sul punto trattato

**APERTURA MASSIMA**
____ mm
con calibro

**DOLORE RIFERITO**
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

### Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

### Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Stimolare il riflesso faringeo
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

## Esercizio domiciliare associato

| ESERCIZIO | ESECUZIONE | DOSAGGIO |
|---|---|---|
| **Rilassamento in apertura** | Aprire lentamente con lingua al palato mantenendo 5 secondi | 10 ripetizioni, 2 volte al giorno |

! **Nota clinica.** La palpazione intraorale richiede delicatezza: attiva facilmente il riflesso faringeo.

## Bibliografia essenziale


1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.