PROTOCOLLO 45

Trigger point del trapezio superiore

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal trapezio superiore

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a regione temporale, angolo mandibolare e collo
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore cervicale e cefalea associati

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino o seduto.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Localizzazione

Palpa il bordo superiore del trapezio tra collo e spalla e individua la banda tesa.

2



FASE 2

Compressione ischemica

Afferra con presa a pinza o comprimi con il pollice con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).

3



FASE 3

Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.

4



FASE 4

Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE	APERTURA MASSIMA	DOLORE RIFERITO
____ / 10	____ mm	Sì / No
sul punto trattato	con calibro	riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sul plesso brachiale
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Allungamento del trapezio	Inclinazione controlaterale del capo con spalla abbassata	3 x 30 secondi per lato

! **Nota clinica.** Il trapezio superiore contribuisce spesso alla cefalea e al dolore mandibolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.