PROTOCOLLO 46

Rilascio dei muscoli suboccipitali

Ridurre la tensione suboccipitale che influenza capo, collo e mandibola

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con cefalea o dolore cervicale	5 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Cefalea occipitale
- ✓ Postura con capo in avanti
- ✓ Tensione cervicale alta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: seduto alla testa del lettino, polpastrelli sotto l'occipite.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione delle dita
Polpastrelli sotto la linea nucale, palmi verso l'alto.



Appoggio
Lascia che il peso del capo crei la pressione.



Trazione
Aggiungi una lieve trazione craniale.



Rilascio
Mantieni fino al rilassamento percepito.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	2 a 3 minuti
Pressione	peso del capo
Ripetizioni	1 o 2

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Tecnica molto rilassante
- ✓ Lascia lavorare la gravità
- ✓ Ideale prima del lavoro cervicale

Errori da evitare

- ! Pressione attiva eccessiva
- ! Dita sulle vertebre
- ! Movimenti bruschi del capo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autorilascio	Due palline da tennis in una calza sotto l'occipite, da supino	3 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Il rilascio suboccipitale favorisce il rilassamento globale e la riduzione della cefalea.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.